

Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant, långverkande

Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

Instruktionen gäller för: ELOCTA 250, 500, 1000, 1500, 2000 och 3000 E.

Ordination bör ske i antal enheter (E) och hela ampuller för att minimera kassation.

Beredningsinstruktion: Ska iordningställas med medföljande vätska.
Följ instruktionen i bipacksedeln.

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, eftersom det kan leda till skumbildning.
Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd den inte om den är grumlig.

Arbetsmiljö Biologiskt läkemedel, hantera enligt lokal instruktion, -

Administreringsätt

Intravenös injektion: vanligen 1 - 3 min, max 10 mL/min.

Vid administrering ska produktnamn samt batchnummer eller motsvarande dokumenteras i journalen.

Vanlig indikation och dos

Ordineras i antal enheter (E). Avrunda om möjligt till hela ampuller.

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-27 12:17:45
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-05 08:57:58
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4487
ID/spårnummer: 3634
Giltig fr o m: 2017-09-05 08:57:58
Utskriftsdatum: 2017-09-07

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant, långverkande

Blödning hos patient med Hemofili A, akut behandling

Ges så tidigt som möjligt utan att blödning är verifierad.
OBS! Kontakta alltid koagulationsjour.

Vid mindre blödningar ges samma dos som patienten tar hemma i förebyggande syfte, för koagulationsfaktor VIII vanligen 20 - 40 E/kg.

Vid allvarliga blödningar och vid t ex trauma mot huvudet eller buk krävs minst dubbla dosen koagulationsfaktor VIII.

Behandlingslängd och dosintervall varierar beroende på blödningens allvarlighetsgrad, de invasiva ingreppen och individuell farmakokinetik.

Profylaxbehandling till patienter med Hemofili A moderat - svår

20 - 40 E/kg 3 - 4 gånger/vecka.

I några fall, speciellt hos yngre patienter, kan kortare dosintervall eller högre doser krävas.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
50 E/kg		250 E	500 E	2500 E

Hållbarhet preparat:

ELOCTA (registrerad produkt)

- 1 Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i kylskåp i originalförpackning, får ej frysas. Ljuskänsligt. Kan förvaras 6 mån i rumstemp, men får därefter inte sättas tillbaka i kylskåp. Efter iordningställande: bör användas omedelbart, men hållbar 6 tim rumstemp i skydd mot solljus.

Övrig information

Till barn rekommenderas i första hand rekombinanta koagulationsfaktorer. Generell klinisk praxis är att patienten behandlas med samma produkt och inte byter mellan olika koagulationsfaktor VIII-produkter. Det finns även plasmaderiverade koagulationsfaktorer, se annan instruktion. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra om det finns skillnad i effekt mellan rekombinanta och plasmaderiverade koagulationsfaktorer.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-27 12:17:45
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-05 08:57:58
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4487
ID/spårnummer: 3634
Giltig fr o m: 2017-09-05 08:57:58
Utskriftsdatum: 2017-09-07

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant, långverkande

Internetadress Internetmedicin - Hemofili (blödarsjuka typ A och B)

<http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5956>

Internetadress SBU- Behandling av blödarsjuka

http://www.sbu.se/contentassets/05a70b4af55c46ffaf17f165e4ccc950/blodarsjuka_sv_smf.pdf

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Coagulation factor VIII, B02BD02

<http://www.fass.se/UF/substance?substanceId=IDE4POI6UC7NMVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-27 12:17:45

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-05 08:57:58

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4487

ID/spårnummer: 3634

Giltig fr o m: 2017-09-05 08:57:58

Utskriftsdatum: 2017-09-07

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

