



Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inj

(Feiba)

Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Feiba 500 E (25 E/mL)

Feiba 1000 E (50 E/mL)

Ordination bör ske i antal enheter (E) och avrundas till hela ampuller för att minimera kassation.

Beredningsinstruktion:

Ska iordningställas med medföljande vätska. Följ instruktionen i bipacksedeln.

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, eftersom det kan leda till skumbildning.

Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös.

ARBETSMILJÖ

Ursprung från blodprodukt, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: ges långsamt, vanligen 3 - 5 min. Max 2 E/kg/min.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

RIMLIG DOS för Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inj

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
50 E/kg	-	-	500 E	2500 E
100 E/kg	-	500 E	1000 E	5000 E

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Feiba (registrerad produkt)

1 st, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Efter iordningställande: bör användas omedelbart men är hållbar 3 tim rumstemperatur. Gäller styrkan 500 & 1000 E.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

Ordineras i antal enheter (E). Avrunda om möjligt till hela ampuller.

Kombinationsbehandling med emicizumab (Hemlibra) ska helst undvikas, diskutera med koagulationskonsult.

Hemofili A- och B-patienter med inhibitorer - Akut behandling samt inför kirurgiskt ingrepp

OBS! Kontakta alltid koagulationsjour.

Vid blödning: Ge så tidigt som möjligt.

Vanlig dos 50 - 70 (- 100) E/kg.

Individuell dos baserat på blödningstyp och individuellt svar.

Profylaxbehandling till patienter med Hemofili A och B med inhibitorer

Vanlig dos 50 - 70 (- 100) E/kg.

ÖVRIG INFORMATION

Feiba innehåller:

- Faktor II, IX och X (icke-aktiverad form)
- Faktor VII (aktiverad form)
- Faktor VIII koagulationsantigen
- Faktor VIII "inhibitor bypassing activity"

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), Hemostas vid allvarlig blödning

<http://www.ssth.se/lankar>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade





Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inj (Feiba)

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4491

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-05-08

ePedID: 4491

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-05-22

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-05-22

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT