



# Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inf

(Feiba)

**Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.**

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Feiba 500 E (25 E/mL)

Feiba 1000 E (50 E/mL)

Ordination bör ske i antal enheter (E) och avrundas till hela ampuller för att minimera kassation.

### Beredningsinstruktion:

Ska iordningställas med medföljande vätska. Följ instruktionen i bipacksedeln.

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, eftersom det kan leda till skumbildning.

Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös.

## ADMINISTRERING

Intravenös infusion: max 2 E/kg/min.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Feiba (registrerad produkt)

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt. Efter iordningställande: bör användas omedelbart, men är hållbar

3 tim i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

Ordineras i antal enheter (E). Avrunda om möjligt till hela ampuller.

Kombinationsbehandling med emicizumab (Hemlibra) ska helst undvikas, diskutera med koagulationskonsult.

### Hemofili A- och B-patienter med inhibitorer - Akut behandling samt inför kirurgiskt ingrepp

OBS! Kontakta alltid koagulationsjour.

Vid blödning: Ge så tidigt som möjligt.

Vanlig dos 50 - 70 (- 100) E/kg.

Individuell dos baserat på blödningstyp och individuellt svar.

### Profylaxbehandling till patienter med Hemofili A och B med inhibitorer

Vanlig dos 50 - 70 (- 100) E/kg.

## ÖVRIG INFORMATION

Feiba innehåller:

- Faktor II, IX och X (icke-aktiverad form)
- Faktor VII (aktiverad form)
- Faktor VIII koagulationsantigen
- Faktor VIII "inhibitor bypassing activity"

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), Hemostas vid allvarlig blödning

<http://www.ssth.se/lankar>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)





## Protrombinkomplex AKTIVERAD intravenös inf (Feiba)

---

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4491](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4491)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4491

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-06-08

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**