

C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert)

Ordineras i samråd med specialist inom allergi.

Instruktionen gäller för: Berinert 500 E och 1500 E
Cinryze 500 E
OBS! Produkterna är ej utbytbara.

Ordination bör ske i antal hela ampuller (st) för att minimera kassation.

Beredningsinstruktion: Ska iordningställas med den vätska och de material som medföljer förpackningen.
Följ instruktionen i bipacksedeln.

Låt, om möjligt, injektionsvätskan anta rumstemperatur inför iordningställande.
Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, då det kan leda till skumbildning.

Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd den inte om den är grumlig.

Administreringsätt

Intravenös injektion: långsam intravenös injektion ca 1 mL/min.

Intravenös infusion: ca 4 mL/min.

Vid administrering ska produktnamn samt batchnummer eller motsvarande dokumenteras i journalen.

Vanlig indikation och dos

Ordineras i antal ampuller (st). Avrunda om möjligt till hela ampuller.

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-07-03 15:18:16
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-05 08:40:46
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4493
ID/spårnummer: 3631
Giltig fr o m: 2017-09-05 08:40:46
Utskriftsdatum: 2017-09-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert)

Hereditärt angioödem typ I och II (HAE), Behandling

Vanlig dos: 20 E/kg

Barn under 30 kg: kan avrundas uppåt till 500E

Barn under 30 - 60 kg: 1000 E

Barn över 60 kg: 1500 E (1000 E är oftast tillräckligt om ej livshotande symptom).

Hereditärt angioödem typ I och II (HAE), Profylax

15 - 30 E/kg (max 1 000 E/dos) x 1.

Ska ges mindre än 6 tim före ingrepp/procedur.

Hållbarhet preparat:

C1-esterashämmare (registrerad produkt)

- 1 Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen.

Ljuskänsligt. Den färdigbereda lösningen bör användas omedelbart men hållbar 3 tim (Cinryza) eller 8 tim (Berinert) i rumstemperatur.

Övrig information

C1-esterashämmarna innehåller 4,86 mg natrium/mL (Berinert) och 2,3 mg/mL (Cinryze). Detta bör beaktas för patienter där natriumrestriktion är aktuellt.

Om anafylaktisk reaktion inträffar skall behandlingen avbrytas omedelbart. Nytt ställningstagande tas av behandlande läkare.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4493

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-07-03 15:18:16

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-05 08:40:46

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4493

ID/spårnummer: 3631

Giltig fr o m: 2017-09-05 08:40:46

Utskriftsdatum: 2017-09-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



C1-esterashämmare intravenös inf/inj **(ex Berinert)**

Substansspecifika uppgifter

C1-inhibitor, B02AB03

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-07-03 15:18:16
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-05 08:40:46
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4493
ID/spårnummer: 3631
Giltig fr o m: 2017-09-05 08:40:46
Utskriftsdatum: 2017-09-05

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

