



C1-esterashämmare intravenös inf/inj

(ex Berinert)

Ordineras i samråd med specialist inom allergologi.

Om anafylaxi inträffar, avbryt behandling omedelbart.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Berinert 500 E och 1500 E
Cinryze 500 E

OBS! Produkterna är ej utbytbara

Ordination bör ske i antal hela ampuller (st) för att minimera kassation.

Beredningsinstruktion:

Ska iordningställas med den vätska och de material som medföljer förpackningen.
Följ instruktionen i bipacksedeln.

Låt, om möjligt, injektionsvätskan anta rumstemperatur inför iordningställande.
Roter flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, då det kan leda till skumbildning.

Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd inte om den är grumlig.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Långsam intravenös injektion

Intravenös infusion: ca 4 mL/min.

Profylax: Ska ges mindre än 6 tim (Berinert) alternativt 24 tim (Cinryze) före ingrepp/procedur .

Vid administrering ska produktnamn samt batchnummer eller motsvarande dokumenteras i journalen.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i antal ampuller (st). Avrunda om möjligt till hela ampuller.

Hereditärt angioödem typ I och II (HAE), Behandling och profylax inför procedur

Vid profylaktisk behandling finns mer erfarenhet kring användning av Berinert.

Vanlig dos: 20 E/kg

Barn under 30 kg: 500 E

Barn 30 - 60 kg: 1000 E

Barn över 60 kg: 1000 E är oftast tillräckligt om ej livshotande symptom, max 1500 E

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4493

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-08-24

ePedID: 4493

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-09-04

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT



C1-esterashämmare intravenös inf/inj

(ex Berinert)

ÖVRIG INFORMATION

C1-esterashämmarna innehåller natrium; 4,86 mg/mL (Berinert) och 2,3 mg/mL (Cinryze). Detta bör beaktas för patienter där natriumrestriktion är aktuell.

Hos patienten med benägenhet för allergiska reaktioner bör antihistamin och steroider ges profylaktiskt.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Berinert (registrerad produkt)

500 E, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Den färdigbereda lösningen bör användas omedelbart men är hållbar 8 tim i rumstemperatur.

1500 E, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30°C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Den färdigbereda lösningen bör användas omedelbart men är hållbar 8 tim i rumstemperatur.

Cinryze (registrerad produkt)

500 E, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Den färdigbereda lösningen bör användas omedelbart men är hållbar 3 tim i rumstemperatur.