



Flekainid oralt

(Tambocor) tablett/kapsel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 100 mg (Tambocor)
Extemporekapsel med valfri styrka

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Kapseln går att öppna och innehållet går att ge med mat. Viktigt att patienten får i sig hela dosen.

Tabletten kan delas för att underlätta nedsväljning. Brytskåran är inte avsedd för att ge halva dosen.

Enteralt i sond: Kapselns innehåll kan slamas upp i vatten för omedelbar administrering i sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Flekainid (extempore - ej lagervara)

1 st, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

Tambocor (registrerad produkt)

100 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Allvarlig ventrikulär takykardi (VT) och supraventrikulär takykardi (SVT)

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 0,2 - 0,5 mg/kg x 3

Måldos 1 - 2 mg/kg x 3, max 8 mg/kg/dygn

Monitorera blodtryck, EKG och QTc-tid dagligen.

Monitorera S-flekanid efter behov.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4505

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-07-03

ePedID: 4505

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-08-07

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-08-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT