



# Metoprolol oralt

(ex Seloken, extempore) tablett/kapsel/depottabletter

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 50 mg (Seloken)  
Kapsel med valfri styrka (extempore)  
Depottabletter 25, 50, 100 och 200 mg (ex SelokenZOC)

Metoprolol finns även som oral lösning i olika koncentrationer t.ex 1 mg/mL resp. 5 mg/mL (extempore), se annan instruktion.

## ADMINISTRERING

Oralt:

Tablett: Kan delas endast för att underlätta nedsväljning. Brytskåran är inte avsedd för att ge halva dosen.

Kapsel: Kan öppnas före administrering och hela innehållet kan därefter hällas på en liten mängd mjuk mat t.ex. äppelmos, yoghurt (ska ges inom 60 min).

Depottablett: Sväljs hel, se Övrig information.

Enteralt:

Välj i första hand metoprolol oral lösning (extempore), se annan instruktion.

Kapsel (laktos som bärarsubstans): kan öppnas och hela innehållet lösas i lämplig mängd vatten.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Metoprolol (registrerad produkt)

Depottablett

Förvaras i 25 - 30 °C, i originalförpackning. Viss variation i förvaringsrekommendationer mellan olika fabrikat kan förekomma.

Tablett

Förvaras i rumstemperatur.

### Metoprolol APL (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Metoprolol sänker både blodtryck och hjärtfrekvens.  
Maximal effekt uppnås inom 1 - 2 tim, se Övrig information.

### Hjärtsvikt med nedsatt kammarfunktion

Ordineras i samråd med barnkardiolog

Barn:

Initial behandling (tablett/kapsel): 0,1 - 0,2 mg/kg x 2

Dosen trappas upp 1 (- 2) gånger per vecka och därefter ev övergång till depottablett.

Underhållsbehandling: 1 - 2 mg/kg/DYGN, max 200 mg/DYGN.

Dygnsdosen ges som depottablett EN gång per dag, alternativt fördelas dygnsdosen på TVÅ dostillfällen för tablett/kapsel om övergång till depottablett inte är möjlig.

### Hypertoni

Barn 1 mån - 18 år:

Initial behandling (tablett /kapsel): 0,25 - 0,5 mg/kg x 2, max 2 mg/kg/DYGN.

Underhållsbehandling: 0,5 - 1 (- 2) mg/kg/DYGN, max 200 mg/DYGN.

Dygnsdosen ges som depottablett EN gång per dag, alternativt fördelas dygnsdosen på TVÅ dostillfällen för tablett/kapsel om övergång till depottablett inte är möjlig.





## Metoprolol oralt

(ex Seloken, extempore) tablett/kapsel/depottabletter

### ÖVRIG INFORMATION

Seloken tablett är en snabbfrisättande tablett och maxkoncentration uppnås inom 1 - 2 tim.

Metoprolol kapsel APL är en snabbfrisättande kapsel dock är det inte fastställt när maxkoncentrationen kan uppnås eftersom inga farmkokinetiska eller farmkodynamiska studier är utförda för produkten.

SelokenZoc/Metoprolol/Metomytan depottablett, bör sväljas hela för att inte förlora dess effekt. Depottabletter har en långsam och jämn frisättning över hela dygnet vilket ger en jämn plasmakoncentration och en effektduration på 24 tim.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress <https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/426/metoprolol>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4514](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4514)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4514

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-01-16

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**