



Metoprolol oralt

(ex Seloken, extempore) tablett/kapsel/depottablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depottabletter 25, 50, 100 och 200 mg (ex SelokenZOC)

Tablett 50 mg (Seloken)

Kapsel med valfri styrka (extempore)

Metoprolol finns även som oral lösning i olika koncentrationer t.ex 1 mg/mL resp. 5 mg/mL (extempore), se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt:

Tablett: Tabletten kan delas för att underlätta nedsväljning. Brytskåran är inte avsedd för att ge halva dosen.

Depottablett: Sväljs hela

Kapsel: Kan öppnas före administrering och innehållet kan därefter hällas på en liten mängd mjuk mat t.ex. äppelmos, youghurt (ska ges inom 60 min).

Enteral:

Välj i första hand metoprolol oral lösning (extempore), se annan instruktion.

Kapsel (laktos som bärarsubstans): kan öppnas och innehållet löses i lämplig mängd vatten. Kan ges i sond från 12Fr. Se till att patienten får i sig hela dosen genom att skölja ur spruta/kopp med ytterligare vatten som också ges till patienten.

Delmängd av blandningen bör inte ges pga osäker dosnoggrannhet.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Metoprolol (registrerad produkt)

Depottablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller alla styrkor.

Tablett

Förvaras i rumstemperatur.

Metoprolol APL (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Metoprolol sänker både blodtryck och hjärtfrekvens.

Hjärtsvikt med nedsatt kammarfunktion

Barn:

Initial behandling (tablett/kapsel): 0,1 - 0,2 mg/kg x 2

Dosen trappas upp 1 (- 2) gånger per vecka och därefter ev övergång till depottablett.

Underhållsbehandling (depottablett): 1 - 2 mg/kg x 1,

max 6 mg/kg/dygn, max 200 mg/dygn

Hypertoni

Barn 1 - 18 år:

Initial behandling (tablett /kapsel): 0,25 - 0,5 mg/kg x 2, max 2 mg/kg/dygn

Underhållsbehandling (depottablett): 0,5 - 1 (- 2) mg/kg x 1, max 200 mg x 1

ÖVRIG INFORMATION

Seloken tablett är en snabbfrisättande tablett och maxkoncentration uppnås inom 1 - 2 tim.

SelokenZoc/Metoprolol/Metomylan depottablett har en långsam och jämn frisättning över hela dygnet vilket ger en jämn plasmakoncentration och en effektduration på 24 tim.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>





Metoprolol oralt

(ex Seloken, extempore) tablett/kapsel/depottablett

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4514

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4514

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-02-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT