



Metoprolol oralt

(ex Seloken, extempore) tablett/kapsel/depottabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 50 mg (Seloken)
Kapsel med valfri styrka (extempore)
Depottabletter 25, 50, 100 och 200 mg (ex SelokenZOC)

Metoprolol finns även som oral lösning i olika koncentrationer t.ex 1 mg/mL resp. 5 mg/mL (extempore), se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt:

Tablett: Kan delas endast för att underlätta nedsväljning. Brytskåran är inte avsedd för att ge halva dosen.

Kapsel: Kan öppnas före administrering och hela innehållet kan därefter hällas på en liten mängd mjuk mat t.ex. äppelmos, yoghurt (ska ges inom 60 min).

Depottablett: Sväljs hela, se Övrig information.

Enteralt:

Välj i första hand metoprolol oral lösning (extempore), se annan instruktion.

Kapsel (laktos som bärarsubstans): kan öppnas och hela innehållet löses i lämplig mängd vatten.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Metoprolol (registrerad produkt)

Depottablett

Förvaras i 25 - 30 °C, i originalförpackning. Viss variation i förvaringsrekommendationer mellan olika fabrikat kan förekomma.

Tablett

Förvaras i rumstemperatur.

Metoprolol APL (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Metoprolol sänker både blodtryck och hjärtfrekvens.

Hjärtsvikt med nedsatt kammarfunktion

Barn:

Initial behandling (tablett/kapsel): 0,1 - 0,2 mg/kg x 2

Dosen trappas upp 1 (- 2) gånger per vecka och därefter ev övergång till depottablett.

Underhållsbehandling: 1 - 2 mg/kg/DYGN, max 200 mg/DYGN.

Dygnsdosen ges som depottablett EN gång per dag, alternativt fördelas dygnsdosen på TVÅ dostillfällen för tablett/kapsel om övergång till depottablett inte är möjlig.

Hypertoni

Barn 1 - 18 år:

Initial behandling (tablett /kapsel): 0,25 - 0,5 mg/kg x 2, max 2 mg/kg/DYGN.

Underhållsbehandling: 0,5 - 1 (- 2) mg/kg/DYGN, max 200 mg/DYGN.

Dygnsdosen ges som depottablett EN gång per dag, alternativt fördelas dygnsdosen på TVÅ dostillfällen för tablett/kapsel om övergång till depottablett inte är möjlig.

ÖVRIG INFORMATION

Seloken tablett är en snabbfrisättande tablett och maxkoncentration uppnås inom 1 - 2 tim.

Metoprolol kapsel APL är en snabbfrisättande kapsel dock är det inte fastställt när maxkoncentrationen kan uppnås eftersom inga farmkokinetiska eller farmkodynamiska studier är utförda för produkten.

SelokenZoc/Metoprolol/Metomytan depottablett, bör sväljas hela för att inte förlora dess effekt. Depottabletter har en långsam och jämn frisättning över hela dygnet vilket ger en jämn plasmakoncentration och en effektduration på 24 tim.





Metoprolol oralt

(ex Seloken, extempore) tablett/kapsel/depottabletter

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4514

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4514

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-08-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT