



Metoprolol oralt

(ex Seloken, extempore) tablett/kapsel/depottabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 50 mg (Seloken)

Kapsel med valfri styrka (extempore)

Depottabletter 25, 50, 100 och 200 mg (ex SelokenZOC)

Metoprolol finns även som oral lösning i olika koncentrationer t.ex 1 mg/mL resp. 5 mg/mL (extempore), se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Maximal effekt uppnås inom 1 - 2 tim, se Övrig information.

Oralt:

Tablett: Kan endast delas för att underlätta nedsväljning. Brytskåran är inte avsedd för att ge halv dos.

Kapsel: Kan öppnas före administrering och hela innehållet hällas på en liten mängd mjuk mat (ska ges inom 60 min).

Depottablett: Sväljs hel, se Övrig information.

Enteralt:

Välj i första hand oral lösning (extempore), se annan instruktion.

Kapsel (laktos som bärarsubstans): kan öppnas och hela innehållet lösas i vatten i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Metoprolol (registrerad produkt)

Depottablett

Förvaras i 25 - 30 °C, i originalförpackning. Förvaringsrekommendationerna varierar mellan olika fabrikat, se respektive produktresumé.

50 mg, Tablett

Förvaras i rumstemperatur.

Metoprolol APL (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hjärtsvikt med nedsatt kammarfunktion

Ordineras i samråd med barnkardiolog.

Barn 1 mån - 18 år:

Initial behandling (tablett/kapsel): 0,1 - 0,2 mg/kg x 2

Dosen trappas upp 1 (- 2) gånger per vecka och därefter ev övergång till depottablett.

Underhållsbehandling: 1 - 2 mg/kg/DYGN, max 200 mg/DYGN

Dygnsdosen ges som depottablett EN gång per dag, alternativt fördelas dygnsdosen på TVÅ dostillfällen för tablett/kapsel om övergång till depottablett inte är möjlig.

Hypertoni

Ordineras i samråd med barnnefrolog.

Barn 1 mån - 18 år:

Initial behandling (tablett /kapsel): 0,25 - 0,5 mg/kg x 2, max 2 mg/kg/DYGN

Underhållsbehandling: 0,5 - 1 (- 2) mg/kg/DYGN, max 200 mg/DYGN

Dygnsdosen ges som depottablett EN gång per dag, alternativt fördelas dygnsdosen på TVÅ dostillfällen för tablett/kapsel om övergång till depottablett inte är möjlig.





Metoprolol oralt

(ex Seloken, extempore) tablett/kapsel/depottabletter

ÖVRIG INFORMATION

Metoprolol sänker både blodtryck och hjärtfrekvens.

Seloken tablett är en snabbfrisättande tablett och maxkoncentration uppnås inom 1 - 2 tim.

Metoprolol kapsel APL är en snabbfrisättande kapsel dock är det inte fastställd när maxkoncentrationen kan uppnås eftersom inga farmkokinetiska eller farmkodynamiska studier är utförda för produkten.

SelokenZoc/Metoprolol/Metomylan depottablett, bör sväljas hela för att inte förlora dess effekt. Depottabletter har en långsam och jämn frisättning över hela dygnet vilket ger en jämn plasmakoncentration och en effektduration på 24 tim.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress <https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/426/metoprolol>

NeoFax

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4514

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4514

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-06-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT