



Liotyronin intravenös inf 20 mikrog/mL

(ex Thyrotardin licens)

EN-STEGSSPÄDNING

Thyrotardin		Medföljande vätska		INF
100 mikrog				20 mikrog/mL
1 st	+	5 mL	=	5 mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: Under 30 min

Intravenös infusion (kontinuerlig)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Thyrotardin (licensprodukt)

20 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 24 tim kyl, 12 tim rumstemp

ÖVRIG INFORMATION

20 - 25 mikrog av liotyronin-natrium är ekvivalent med ca 100 mikrog levotyroxin-natrium.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Svår hjärtsvikt hos barn med brist på thyroidea-hormon.

Dag 1: 2 mikrog/kg

Dag 2 - 12: 1 mikrog/kg

Alternativt infusion 0,05 - 0,15 mikrog/kg/tim

Behandlingstid: upp till 12 dagar.

RIMLIG DOS FÖR 20 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mikrog/kg/tim	-	-	-	0,2 mL/tim
1 mikrog/kg	0,05 mL	0,2 mL	0,5 mL	2,5 mL

REFERENS/LÄNK

Artikel Bettendorf M., et al. Tri-iodothyronine treatment in children after cardiac surgery: a double-blind, randomised, placebo-controlled study. *Lancet* 2000, 356, 9229, 529-534.

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673600025769?via%3Dihub>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Rekommendation (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Thyrotardin-inject (SPC)

<https://mein.sanofi.de/produkte/Thyrotardin-inject/Downloads?id=f92a1471-e5e4-45f9-8119-b2e4c3cf94ae>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2017-12-07 18:58:46

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-22 10:22:21

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4519

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2017-12-22 10:22:21

KONTROLLERA ALLTID ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFTEN GJORDES