



Liotyronin intravenös inf/inj 20 mikrog/mL

(ex Thyrotardin licens)

EN-STEGSSPÄDNING

Thyrotardin		Medföljande vätska		INJ-INF LÖ
100 mikrog				20 mikrog/mL
1 st	+	5 mL	=	5 mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion: Ges som långsam injektion eller infusion.

Intravenös infusion (kontinuerlig)

RIMLIG DOS för Liotyronin intravenös inf/inj 20 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mikrog/kg	0,05 mL	0,25 mL	0,5 mL	2,5 mL
0,1 mikrog/kg/tim	-	-	-	0,25 mL/tim

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Thyrotardin (licensprodukt)

100 mikrog, Pulver till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.

20 mikrog/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Svår hjärtsvikt hos barn med brist på thyreoidea-hormon

Dag 1: 2 mikrog/kg

Dag 2 - 12: 1 mikrog/kg

Ges med fördel som kontinuerlig infusion.

Behandlingstid: upp till 12 dagar.

ÖVRIG INFORMATION

20 - 25 mikrog av liotyronin-natrium är ekvivalent med ca 100 mikrog levotyroxin-natrium.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

PubMed PMID Bettendorf M., et al. Tri-iodothyronine treatment in children after cardiac surgery: a double-blind, randomised, placebo-controlled study. Lancet 2000.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10950228>

Rekommendation (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Thyrotardin-inject (SPC)

<https://mein.sanofi.de/produkte/Thyrotardin-inject/Downloads?id=f92a1471-e5e4-45f9-8119-b2e4c3cf94ae>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-09-17

ePedID: 4519

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-09-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-09-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT