



Etambutol oralt

(ex Myambutol) tablett/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 400 mg (Myambutol)
Kapsel i valfri styrka (extempore)

Vid restsituation för godkänd produkt kan licensprodukt EMB-Fatol tablett 400 mg användas.

ADMINISTRERING

Oralt:

Delmängd av tablett eller kapsel får inte ges (tablett saknar brytskåra).

Extemporekapslar med patientindividuell styrka kan beställas. Kapslarna kan öppnas och innehållet strös på lite mat eller lösas upp i lite vatten. Detta ska ske i direkt anslutning till administreringen.

Enteralt:

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

Det kan ta några minuter för drageringen att lösa upp sig.

Kapslarna kan öppnas och innehållet lösas upp i lite vatten. Detta ska ske i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Etambutol (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

Myambutol (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller även licensprodukter.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ges i kombination med andra tuberkulosläkemedel.

Aktiv tuberkulos

Nyfödda: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1

Barn upp till 25 kg: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1

Barn över 25 kg: 15 - 20 mg/kg x 1, max 1600 mg/DOS

Behandlingstid:

Vid känslig stam: etambutol sätts ut efter provsvar när resistensmutation för isoniazid och rifampicin saknas

Övriga fall: 2 mån

Tuberkulös meningit

Nyfödda: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1

Barn upp till 25 kg: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1

Barn över 25 kg: 25 mg/kg x 1, max 1600 mg/DOS

Behandlingstid: 2 mån

ÖVRIG INFORMATION

Patientens färgseende och synskärpa ska kontrolleras regelbundet under behandlingstiden.

I doseringsregimer för behandling av tuberkulos benämns etambutol E.



Etambutol oralt

(ex Myambutol) tablett/kapslar



REFERENS/LÄNK

Bok Starke J R et al. 2016. Handbook of Child & Adolescent Tuberculosis. Oxford University Press Inc. Första upplagan.

Internetadress Svenska Infektionsläkarföreningen - Vårdprogram CNS-infektioner, bakteriella

<https://infektion.net/vardprogram/cns-infektioner-bakteriella/>

Internetadress Svenska Infektionsläkarföreningen - Vårdprogram tuberkulos

<https://infektion.net/vardprogram/tuberkulos/>

Internetadress WHO - Guidelines on tuberculosis

<https://www.who.int/health-topics/tuberculosis>

Läkemedelsverket SPC - Myambutol

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=20060706000067>

PubMed PMID B D Daniel et al. Tuberculous meningitis in children: Clinical management & outcome

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31670267>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4528

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4528

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-01-26

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT