



## Etambutol oralt

(ex Myambutol) tabletter/kapslar

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 400 mg (Myambutol)  
Kapsel i valfri styrka (extempore)  
Tablett 100, 250, 400 och 500 mg (EMB-Fatol licens)

### ADMINISTRERING

Delmängd av kapsel eller tablett Myambutol får inte ges, tablett saknar brytskåra.

Extemporekapslar med patientindividuell styrka kan beställas.

Tablett EMB-Fatol 250, 400 och 500 mg har brytskåra och kan delas i två lika stora doser.  
Tablett EMB-Fatol 100 mg saknar brytskåra.

Oralt:

Vid sväljsvårigheter kan tabletterna krossas och blandas med vatten, äppeljuice eller äppelmos. Kapslarna kan öppnas och innehållet strös på lite mat eller lösas upp i lite vatten. Detta ska ske i direkt anslutning till administreringen.

Enteralt:

Tabletterna kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. Det kan ta några minuter för drageringen att lösa upp sig.  
Kapslarna kan öppnas och innehållet lösas upp i lite vatten. Detta ska ske i direkt anslutning till administreringen.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### .Myambutol (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras vid högst 25 °C.

#### EMB-Fatol (licensprodukt)

Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

#### Etambutol (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ges i kombination med andra tuberkulosläkemedel.

#### Aktiv tuberkulos

Nyfödda: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1

Barn upp till 25 kg: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1

Barn över 25 kg: 15 - 20 mg/kg x 1, max 1600 mg/DOS

Behandlingstid:

Om provsvar visar på en mykobakteriestam känslig för isoniazid och rifampicin kan etambutol sättas ut.

Övriga fall: 2 mån

#### Tuberkulös meningit

Nyfödda: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1

Barn upp till 25 kg: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1

Barn över 25 kg: 25 mg/kg x 1, max 1600 mg/DOS

Behandlingstid: 2 mån

### ÖVRIG INFORMATION

Patientens färgseende och synskärpa ska kontrolleras regelbundet under behandlingstiden.

I doseringsregimer för behandling av tuberkulos benämns etambutol E.





## Etambutol oralt

(ex Myambutol) tabletter/kapslar

### REFERENS/LÄNK

Bok Starke J R et al. 2016. Handbook of Child & Adolescent Tuberculosis. Oxford University Press Inc. Första upplagan.

Internetadress Svenska Infektionsläkarföreningen - Vårdprogram CNS-infektioner, bakteriella

<https://infektion.net/knowledge/vardprogram-bakteriella-cns-infektionervardprogram/>

Internetadress Svenska Infektionsläkarföreningen - Vårdprogram tuberkulos

<https://infektion.net/knowledge/vardprogram-tuberkulos/>

Internetadress WHO - Guidelines on tuberculosis

<https://www.who.int/health-topics/tuberculosis>

Läkemedelsverket SPC - Myambutol

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=20060706000067>

PubMed PMID B D Daniel et al. Tuberculous meningitis in children: Clinical management & outcome

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31670267>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Summary of Product Characteristics (SPC) EMB-Fatol tabletter

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs8136-160155217-129/native/SPC%20EMB-Fatol%20tabl%20400%20mg%20Riemser%20Pharma%20GmbH%20vnr%20741582.pdf>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4528](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4528)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4528

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-08-15

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**