



Etambutol oralt

(ex Myambutol) tabletter/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 400 mg (Myambutol)
Kapsel i valfri styrka (extempore)
Tablett 100, 250, 400 och 500 mg (EMB-Fatol licens)
Dispergerbar tablett 100 mg (licens)

ADMINISTRERING

Tablett Myambutol saknar brytskåra.

Tablett EMB-Fatol 250, 400 och 500 mg har brytskåra och kan delas i två lika stora doser.
Tablett EMB-Fatol 100 mg saknar brytskåra.

Dispergerbar tablett har brytskåra och kan delas i två lika stora doser. Tabletten kan lösas i lite vatten och drickas.

Extemporekapslar med patientindividuell styrka kan beställas.

Oralt:

Vid sväljsvårigheter kan tabletterna krossas och blandas med vatten, äppeljuice eller äppelmos. Kapslarna kan öppnas och innehållet strös på lite mat eller lösas upp i lite vatten. Detta ska ske i direkt anslutning till administreringen.

Entertalt:

Tabletterna kan krossas och slammats upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. Det kan ta några minuter för drageringen att lösa upp sig.
Kapslarna kan öppnas och innehållet lösas upp i lite vatten. Detta ska ske i direkt anslutning till administreringen.
För dispergerbar tablett saknas information om enteral administrering.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ges i kombination med andra tuberkulosläkemedel.

Patientens färgseende och synskärpa ska kontrolleras regelbundet under behandlingstiden. Om synskärpan försämras ska behandlingen avbrytas.

Bör ordineras i samråd med infektionsläkare.

Aktiv tuberkulos

Nyfödda: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1
Barn 1 mån - 14 år: (15 -) 20 (- 25) mg/kg x 1, max 1600 mg x 1
Barn 15 - 18 år: 15 - 20 mg/kg x 1, max 1600 mg x 1

Behandlingstid:

Om odlingssvar visar på en mykobakteriestam känslig för isoniazid och rifampicin kan etambutol sättas ut.

Övriga fall: 2 mån

Tuberkulös meningit

Multi- eller rifampicinresistent tuberkulos (MDR/RR-TB)

Nyfödda: 15 - 25 mg/kg x 1
Barn 1 mån - 14 år: 15 - 25 mg/kg x 1, max 1600 mg x 1
Barn 15 - 18 år: 25 mg/kg x 1, max 1600 mg x 1

Behandlingstid:

Tuberkulös meningit: 2 mån

MDR/RR-TB: vanligen minst 9 mån

ÖVRIG INFORMATION

I doseringsregimer för behandling av tuberkulos benämns etambutol E.





Etambutol oralt

(ex Myambutol) tabletter/kapslar

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

.Myambutol (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras vid högst 25 °C.

EMB-Fatol (licensprodukt)

Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

Etambutol (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

Etambutol. (licensprodukt)

Dispergerbar tablett

Förvaras i rumstemperatur (under 30 °C). Förvaras i ytterförpackningen, ljuskänsligt.

REFERENS/LÄNK

Bok Starke J R et al. 2016. Handbook of Child & Adolescent Tuberculosis. Oxford University Press Inc. Första upplagan.

Internetadress Svenska Infektionsläkarföreningen - Vårdprogram CNS-infektioner, bakteriella

<https://infektion.net/knowledge/varprogram-bakteriella-cns-infektionervardprogram/>

Internetadress Svenska Infektionsläkarföreningen - Vårdprogram tuberkulos

<https://infektion.net/knowledge/varprogram-tuberkulos/>

Internetadress WHO - Guidelines on tuberculosis

<https://www.who.int/health-topics/tuberculosis>

Läkemedelsverket SPC - Myambutol

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=20060706000067>

PubMed PMID B D Daniel et al. Tuberculous meningitis in children: Clinical management & outcome

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31670267>

PubMed PMID Chiang SS et al. Clinical standards for drug-susceptible TB in children and adolescents. Int J Tuberc Lung Dis 2023.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37491754>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) EMB-Fatol tabletter

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs8136-160155217-129/native/SPC%20EMB-Fatol%20tabl%20400%20mg%20Riemsers%20Pharma%20GmbH%20vnr%20741582.pdf>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4528

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4528

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-10-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT