



Naloxegol oralt

(Moventig) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 12,5 och 25 mg (Moventig)

ADMINISTRERING

Moventig ska tas på tom mage, minst 30 min före dagens första måltid eller 2 tim efter dagens första måltid. Bör tas på morgonen för att undvika tarmtömning nattetid.

Oralt: Vid sväljsvårigheter kan tablett krossas och blandas i vatten.

Enteralt: kan ges i nasogastrisk sond (från 8 Fr) efter krossning och uppslamning i vatten.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Moventig (registrerad produkt)

12,5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkan 25 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Opioidinducerad förstoppning (bristande evidens)

Bör ordineras vid längre än 3 dagars opioidbehandling.

Barn från 1 år och under 30 kg: 12,5 mg x 1 (på morgonen)

Barn från 30 kg: 25 mg x 1 (på morgonen)

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-08-17

ePedID: 4530

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-08-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-08-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN Kopia ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT