

Acetylcystein oralt brustablett

Instruktionen gäller för: Brustablett 200 mg och 600 mg

Beredningsinstruktion: 1 brustablett löses upp i 1/2 - 1 glas vatten.

Administreringsätt

Oralt

Vid slemplugg i sond, t.ex. "reploglesond"

Vanlig indikation och dos

Slemlösande vid cystisk fibros

Barn: 400 mg x 3

Barn över 12 år: 400 mg x 3, alternativt 600 mg x 2

Slemlösande vid slemplugg i sond, t.ex. "reploglesond" vid esofagusatresi

1 brustablett á 200 mg löses i ett halvt glas vatten och därefter ges så mycket volym som behövs för att slempluggen ska lossna, oftast 1 - 2 mL.

Hållbarhet preparat:

Acetylcystein (registrerad produkt)

200 mg, Brustablett

Hållbar: Fuktkänsligt. Gäller även för 600 mg.

Referens/Länk

FASS Acetylcystein

<http://www.fass.se/LIF/product?42&userType=2&nplid=200410120000578&docType=3>

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Acetylcysteine, R05CB01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POCGU9IY7VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-09-20 14:59:09

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-09-20 15:12:27

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4540

ID/spårnummer: 3703

Giltig fr o m: 2017-09-20 15:12:27

Utskriftsdatum: 2017-09-20

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

