



Metadon oralt 1 mg/mL

(ex Metadon DnE) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigberedd oral lösning Metadon DnE 1 mg/mL, bör användas i 1:a hand

Alt. 2: Spädning från Metadon Meda injektionsvätska 10 mg/mL, se nedan

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 2

Metadon Meda 10 mg/mL 1 mL	+	NaCl 9 mg/mL 9 mL	=	ORAL LÖSN 1 mg/mL 10 mL
----------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------------------

ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt, stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

ÖVRIG INFORMATION

Denna instruktion avser lågdos-behandling med metadon. Vid högre dosering kan doseringsintervallet behöva förlängas vid upprepad behandling eftersom metadon har lång halveringstid och det annars finns risk för ackumulering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Metadon Meda (registrerad produkt)

10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

1 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Vid egen spädning från 10 mg/mL är lösningen hållbar 12 tim i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Långvariga och komplexa smärttillstånd, vanligen med neuropatisk komponent, som komplement till annan opioidbehandling för att förstärka den analgetiska effekten

Barn 1 mån - 18 år: 0,1 mg/kg x 1 - 2

RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mg/kg	-	0,5 mL	1 mL	5 mL

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-12-19

ePedID: 4557

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-12-19

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-12-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT