



Kalcium oralt 15 mg

(Extempore) kapsel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel 15 mg = 0,374 mmol (extempore)

Kapseln kan öppnas och innehållet blandas med vätska, se Administrering.

ADMINISTRERING

Ska ej ges tillsammans med oralt fosfat eller järn pga risk för komplexbildning. Tidsintervallet ska vara minst 2 timmar mellan deras intag.

Oralt

Enteralt:

Kapslarna med laktos som fyllnadsmedel kan öppnas och innehållet blandas med vatten eller bröstmjolk. Om kapselinnehållet blandas med bröstmjolk finns en risk att det reagerar med det fosfat som finns i bröstmjölken och en fällning kan bildas. Blanda därför noga och kontrollera om möjligt att ingen fällning uppstår.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Kalcium (extempore)

15 mg, Kapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doserna i mmol nedan är samma som för Kalcium oral lösning. På grund av kapslarnas styrka och av praktiska skäl, blir dosen inte exakt när man anger motsvarande i antal kapslar eller mg, men den skillnaden är försumbar.

Osteopeniprofylax hos nyfödda med födelsevikt lägre än 1500 gram

Barn som får OBERIKAD bröstmjolk:

Startdos: 0,35 mmol/kg x 2 1 kapsel/kg x 2 (15 mg/kg x 2)

Underhållsdos:

Normalintag: 0,56 mmol/kg x 4 1,5 kapslar/kg x 4 (22,5 mg/kg x 4)

Vid behov av högre doser*: Kräver för stor mängd tillskott, påbörja om möjligt berikning av bröstmjolk.

Barn som får DELVIS BERIKAD bröstmjolk (se Övrig information):

Startdos: 0,35 mmol/kg x 2 1 kapsel/kg x 2 (15 mg/kg x 2)

Underhållsdos:

Normalintag: 0,35 mmol/kg x 2 1 kapsel/kg x 2 (15 mg/kg x 2)

Vid behov av högre doser*:

0,56 mmol/kg x 4 1,5 kapslar/kg x 4 (22,5 mg/kg x 4)

*Med högre doser menas ett dygnsintag av 4,5 - 5 mmol/kg/dygn. Detta kan behövas vid konstaterad rakit eller s-fosfat lägre än 1,6 mmol/L.

ÖVRIG INFORMATION

För majoriteten av barn sker behandlingsavslut när barnet får fullberikad bröstmjolk eller prematurformula eller när de inte längre sondmatas. Om diagnostiserad rakit sker behandlingsavslut när röntgen normaliserats, dock som längst till 2 månaders korrigerad ålder.



Kalcium oralt 15 mg

(Extempore) kapsel



REFERENS/LÄNK

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Osteopeni

<http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-11-02

ePedID: 4558

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-11-09

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-11-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT