



Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL

(ex Xylocain utan konserveringsmedel)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Lidokain injektionsvätska 10 mg/mL UTAN konserveringsmedel (Lidocaine Accord och Xylocain utan konserveringsmedel)

ADMINISTRERING

Lokalt: Lokalbedövning ex, ytanestesi eller blockad.

Om injektionen upplevs som smärtsam, byt till buffrad lidokain (se annan instruktion).

RIMLIG DOS för Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
3 mg/kg	0,3 mL	1,5 mL	3 mL	15 mL
4 mg/kg	-	2 mL	4 mL	20 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Lidokain utan kons. (registrerad produkt)

10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Sparas ej efter första uttag.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Lokalbedövning

Nyfödda: Max 3 mg/kg. Kan upprepas, men inte oftare än var 4:e timme.

Barn 1 mån-18 år: Max 4 mg/kg/DOS. Kan vid behov upprepas. Minst 4 tim mellan doserna. I enstaka fall kan doser upp mot max 24 mg/kg/DYGN användas.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll 2021-10-07

ePedID: 4563

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-10-12

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-10-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT