

Caspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas)

NATRIUMKLORID 9 mg/mL ska användas för spädning samt spolning före och efter infusionen.

Instruktionen gäller för: Alt. 1: Extemporeberedd caspofungin 0,5 mg/mL
Alt. 2: Spädning från 50 mg eller 70 mg enligt nedan

Två-stegsspädning

FRÅN 50 MG	Caspofungin		Sterilt Vatten	=	Stamlösning
steg1	50 mg 1 st	+	10,8 mL	=	5 mg/mL 10,8 mL
steg2	Stamlösning 5 mg/mL 5 mL	+	NaCl 9 mg/mL 45 mL	=	INF 0,5 mg/mL 50 mL

Två-stegsspädning

FRÅN 70 MG	Caspofungin		Sterilt Vatten	=	Stamlösning
steg1	70 mg 1 st	+	10,8 mL	=	7 mg/mL 10,8 mL
steg2	Stamlösning 7 mg/mL 10 mL	+	NaCl 9 mg/mL 130 mL	=	INF 0,5 mg/mL 140 mL

Beredningsinstruktion: För att lösa upp pulvret, låt injektionsflaskan anta rumstemperatur och tillsätt 10,8 mL sterilt vatten. Blanda försiktigt tills en klar lösning erhålls. Använd inte lösningen om den är grumlig eller har en fällning.

Då injektionsflaskan är överfylld med pulver krävs 10,8 mL sterilt vatten i steg 1.

Får INTE beredas med glukos då caspofungin inte är stabilt i sådan lösning.

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-11-06 15:13:07
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-11-08 13:03:51
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4584
ID/spårnummer: 3867
Giltig fr o m: 2017-11-08 13:03:51
Utskriftsdatum: 2017-11-09

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Caspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL

(ex Cancidas)

Arbetsmiljö Allergirisk, hantera enligt lokal instruktion, Skyddsinformation saknas i FASS

Administreringsätt

Intravenös infusion: Ges under 60 minuter.

Vanlig indikation och dos

Invasiva mykoser inkl. aspergillos samt empirisk behandling av trolig svampinfektion hos neutropena patienter med feber

Nyfödda: 25 mg/m² x 1 alternativt 2 mg/kg x 1

Barn 1 - 2 mån: 25 mg/m² x 1

Barn 3 - 11 mån: 50 mg/m² x 1

Barn 1 - 18 år:

Laddningsdos dag 1: 70 mg/m², max 70 mg

Därefter 50 mg/m² x 1, max 70 mg/dos. Kan ökas till 70 mg/m² x 1, max 70 mg/dos.

Behandlingstid:

Invasiv aspergillos: minst 7 dagar efter tillbakagång av symtomen, ca 6 - 12 veckor

Invasiv candidiasis: minst 14 dagar efter sista positiva odling

Empirisk behandling: 72 timmar efter att neutropenin upphört. Vid påvisad svampinfektion minst 14 dagars behandling och behandlingen bör fortsätta minst 7 dagar efter att neutropenin och symtom upphört.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mg/kg	4 mL	20 mL		
Rimlig dos för barn	0,5 m ²	1 m ²	1,5 m ²	2 m ²
25 mg/m ²	25 mL			
50 mg/m ² , max 70 mg	50 mL	100 mL	140 mL	140 mL
70 mg/m ² , max 70 mg	70 mL	140 mL	140 mL	140 mL

Hållbarhet preparat:

Caspofungin (registrerad produkt)

- 50 mg, Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C), gäller både 50 mg och 70 mg.

- 5 mg/mL, Stamlösning

Hållbar: Stamlösning får INTE sparas pga förväxlingsrisk, gäller både stamlösning 5 mg/mL och 7 mg/mL.

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-11-06 15:13:07

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-11-08 13:03:51

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4584

ID/spårnummer: 3867

Giltig fr o m: 2017-11-08 13:03:51

Utskriftsdatum: 2017-11-09

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Caspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas)

0,5 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Hållbar: 12 timmar i rumstemperatur, 24 timmar i kylskåp.

Övrig information

Denna spädningsinstruktion skiljer sig något från den i FASS. Varje ampull innehåller med avsikt mer pulver än 50 resp. 70 mg för att kunna ge den dos som står på flaskan då man tar 10 mL upplöst stamlösning. Av den anledningen behövs 10,8 mL sterilt vatten för att koncentrationen ska bli 5 mg/mL resp. 7 mg/mL.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

NeoFax

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

casprofungin, J02AX04

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POJPUCJ59VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-11-06 15:13:07
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-11-08 13:03:51
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4584
ID/spårnummer: 3867
Giltig fr o m: 2017-11-08 13:03:51
Utskriftsdatum: 2017-11-09

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

