

# Desloratadin oralt 0,5 mg/mL

(ex Aerius) oral lösning

---

## Administreringsätt

Oralt

Enteralt i sond

---

## Vanlig indikation och dos

### Begränsad allergisk reaktion eller anafylaxi, grad 1

Barn under 6 år: 2,5 mg = 5 mL

Barn 6 - 12 år: 5 mg = 10 mL

Barn över 12 år: 10 mg = 20 mL

Då dessa doser är högre än de i FASS angivna bör recept märkas med OBS

### Symtomatisk behandling av allergi (rinit, urtikaria)

Barn 6 - 11 månader: 1 mg x 1 = 2 mL

Barn 1 - 5 år: 1,25 mg x 1 = 2,5 mL

Barn 6 - 11 år: 2,5 mg x 1 = 5 mL

Barn över 12 år: 5 mg x 1 = 10 mL

### Kronisk idiopatisk urtikaria

Barn 6 - 11 månader: 1 mg x 1 = 2 mL

Barn 1 - 5 år: 1,25 mg x 1 = 2,5 mL

Barn 6 - 11 år: 2,5 mg x 1 = 5 mL

Barn över 12 år: 5 mg x 1 = 10 mL

Dosen kan behöva höjas, ibland till 3 - 4 gånger ovanstående dos.

---

## Hållbarhet preparat:

Desloratadin (ex Aerius) (registrerad produkt)

0,5 mg/mL, Oral lösning

Hållbar: Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen

---

## Övrig information

Oral lösning innehåller propylenglykol, 100 mg/mL.

Detta innebär vid symtomatisk behandling av allergi för barn från 1 till och med 5 år: 2,5 mL (1,25 mg) Aerius oral lösning en gång dagligen, alltså 250 mg

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-12-12 16:01:25

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-20 15:28:20

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 4593

ID/spårnummer: 4128

Giltig fr o m: 2017-12-20 15:28:20

Utskriftsdatum: 2017-12-20

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Desloratadin oralt 0,5 mg/mL

(ex Aeries) oral lösning

propylenglykol. Acceptabel exponering för nyfödda är 25 mg/kg/dygn.

Patienten bör observeras i minst 1 timme vid begränsad allergisk reaktion och 4 timmar vid anafylaxi, grad 1.

---

### Referens/Länk

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Barnallergisektionen PM Anafylaxi

[http://www.barnallergisektionen.se/stenciler\\_nya06/D1%20anafylaxi.pdf](http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/D1%20anafylaxi.pdf)

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Barnallergisektionen Urticaria Utredning och behandling

[http://www.barnallergisektionen.se/stenciler\\_nya06/D5\\_urtikaria.pdf](http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/D5_urtikaria.pdf)

Internetadress Svenska Föreningen för Allergologi: Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling (2015)

[http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/12/Anafylaxi\\_sept\\_2015.pdf](http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/12/Anafylaxi_sept_2015.pdf)

Rekommendation ,(Grade 1C)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4593](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4593)

---

### Substansspecifika uppgifter

Desloratadin, R06AX27

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POJNUCHQWVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-12-12 16:01:25

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-20 15:28:20

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4593

ID/spårnummer: 4128

Giltig fr o m: 2017-12-20 15:28:20

Utskriftsdatum: 2017-12-20

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

