



Desloratadin oralt

(ex Aeries) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Munsönderfallande tablett 2,5 mg resp. 5 mg (ex Caredin)

Tablett 5 mg (ex Aeries)

Vid doser under 2,5 mg, sväljsvårigheter och administrering i enteral infart rekommenderas oral lösning, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Effekten kommer efter ca 30 - 45 min.

Oralt: Tabletter och munsönderfallande tabletter bör inte delas.

Enteralt: Använd oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Desloratadin (registrerad produkt)

Munsönderfallande tablett

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänslig. Gäller båda styrkorna.

5 mg, Filmdragerad tablett

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Begränsad allergisk reaktion eller anafylaxi, grad 1

Då dessa doser är dubbelt så höga, och åldersintervallen lägre mot de i FASS angivna bör recept markeras med OBS.

Barn 1 mån - 5 år: 2,5 mg

Barn 6 - 11 år: 5 mg

Barn 12 - 18 år: 10 mg

Symtomatisk behandling av allergi (rinit, urtikaria)

Barn 6 - 11 mån: 1 mg x 1

Barn 1 - 5 år: 1,25 mg x 1

Barn 6 - 11 år: 2,5 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 5 mg x 1

Kronisk idiopatisk urtikaria

Barn 6 - 11 mån: 1 mg x 1

Barn 1 - 5 år: 1,25 mg x 1

Barn 6 - 11 år: 2,5 mg x 1

Barn 12 - 18 år: 5 mg x 1

Dosen ovan kan behöva höjas, kontakta barnallergispecialist.

ÖVRIG INFORMATION

Det finns begränsad evidens för doser till de mindre barnen.





Desloratadin oralt

(ex Aeries) tabletter

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Chronic spontaneous urticaria in children - a systematic review on interventions and comorbidities. Cornillier et al. 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29392757>

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Anafylaxi/anafylaktisk reaktion (D1)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Urticaria och angioödem (D5)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4594

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4594

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-03-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT