



Midazolam oralt 1 mg/mL

(Extempore) oral lösning

Dos styrs av patientens respons och övervakningsmöjlighet.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Midazolam APL oral lösning 1 mg/mL (extempore, lagerberedning).
Extemporeberedd oral lösning kan även beställas med andra koncentrationer.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Vid premedicinering ges dos 15 - 30 min innan planerad procedur. Effekten varar i 60 - 90 min.

Via APL kan adapterkork och uppdragningspruta som passar förpackningen beställas.

ÖVRIG INFORMATION

Har endast sederande effekt, ej analgetisk. Ej lämpligt att ge till redan agiterade barn.

Midazolam metaboliseras av CYP3A4. Vid samtidig administrering av andra läkemedel som påverkar detta enzym kan midazolamdosen behöva justeras.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Midazolam (extempore - lagervara)

1 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Premedicinering inför procedur

Barn över 6 mån: 0,3 - 0,75 mg/kg, max 10 mg/dos.

Barn under 5 år kan behöva högre doser än äldre barn.

Dosen skall reduceras till patienter med hjärt- eller andningsproblem samt andra högriskpatienter.

RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,3 mg/kg	-	-	3 mL	-
0,75 mg/kg	-	-	7,5 mL	-
Max 10 mg/dos	-	-	-	10 mL

REFERENS/LÄNK

APL databas (AIDA) APL databas (AIDA)

<https://www.apl.se/vard-och-apotek.html>

Internetadress Läkemedelsverket, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

<http://eped.se/referenser>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-06-14

ePedID: 4599

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-06-14

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-06-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT