

# Ibuprofen oralt 40 mg/mL

## (Neurofen Apelsin) oral suspension

---

### Administreringsätt

Skaka suspensionen före användning.

Oralt

Enteralt i sond: Uppdragen volym kan spädas med vatten, 1:1 förhållande, för att minska viskositeten och därmed underlätta administrering.

Maximal analgetisk effekt inträder efter ca 1 - 2 tim.

---

### Vanlig indikation och dos

#### Smärta och/eller feber (inkl huvudvärk, migrän och postoperativ smärta)

Barn över 3 mån: 4 - 10 mg/kg x 3 - 4

Maxdos till barn 3 - 6 mån: 30 mg/kg/dygn

Maxdos till barn under 60 kg (över 6 mån): 40 mg/kg/dygn

Maxdos till barn över 60 kg (öppenvård): 1,2 g/dygn

Maxdos till barn över 60 kg: 2,4 g/dygn

#### Premedicinering inför procedur

Barn över 3 mån: 7 mg/kg

Max 600 mg/dos eller 1,2 g/dygn

#### Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom

Barn över 3 mån: (5 -) 7,5 - 15 mg/kg x 3 - 4

Max 60 mg/kg/dygn eller 2,4 g/dygn

#### Dysmenorré

Barn över 12 år: 400 mg x 1 - 3 vid behov

Max 1,2 g/dygn

---

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
4 mg/kg			1 mL	5 mL
7 mg/kg			1,75 mL	8,75 mL

---

### Hållbarhet preparat:

Ibuprofen (Nurofen Apelsin) (registrerad produkt)

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-02-01 11:34:08

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-08 09:34:59

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 4612

ID/spårnummer: 4305

Giltig fr o m: 2018-02-08 09:34:59

Utskriftsdatum: 2018-02-08

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



# Ibuprofen oralt 40 mg/mL

## (Neurofen Apelsin) oral suspension

● 40 mg/mL, Oral suspension

Hållbar: Förvaras i rumstemperatur. Efter att flaskan öppnats hållbar i 6 mån.

### Övrig information

Ibuprofen är kontraindicerat vid ökad blödningsbenägenhet, pågående/återkommande GI-blödningar, gravt nedsatt leverfunktion och NSAID-känslighet.

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion (inkl pyelonefrit), dehydrering och vid varicella zosterinfektion. Ibuprofen ska inte administreras samtidigt med andra nefrotoxiska läkemedel.

Ibuprofen kan förvärra astma och ska därför undvikas vid allvarlig akut astma.

Ibuprofen är det NSAID-preparat med minst biverkningar och mest evidens för säker användning till barn.

### Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket - Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

<http://eped.se/referenser>

Internetadress Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Nonsteroidal anti-inflammatory drug use and the risk of severe skin and soft tissue complications in patients with varicella or zoster disease

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18251759>

Rekommendation ,(Grade 1B)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjonet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4612](http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4612)

### Substansspecifika uppgifter

Ibuprofen, M01AE01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=IDE4POEKUAAH3VERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-02-01 11:34:08

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-02-08 09:34:59

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4612

ID/spårnummer: 4305

Giltig fr o m: 2018-02-08 09:34:59

Utskriftsdatum: 2018-02-08

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

