



Ranitidin oralt 15 mg/mL

(Zantac) oral lösning

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond: från 4 French.

ÖVRIG INFORMATION

Den orala lösningen (pepparmintsmak) innehåller ca 7,5 % etanol. 1 mL Zantac motsvarar ca 1 mL vin.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Gastroesofagal refluxsjukdom (GERD)

Nyfödda: 0,5 - 2 mg/kg x 3 - 4, max 9 mg/kg/dygn

Barn 1 mån - 18 år: 2,5 - 5 mg/kg x 2, max 600 mg/dygn

Reducera dosen vid nedsatt njurfunktion (GFR under 50 mL/min/1,73 m²).

Kronisk urtikaria/svår klåda (låg evidens)

Barn över 30 kg: 150 mg x 2, max 300 mg/dygn

RIMLIG DOS FÖR 15 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	0,03 mL	0,17 mL	-	-
2 mg/kg	0,13 mL	0,67 mL	-	-
5 mg/kg	-	-	3,33 mL	16,67 mL

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Barnallergisektionen Urticaria Utredning och behandling

http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/D5_urtikaria.pdf

Internetadress Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - GERD, Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar - Vårdprogram

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Fedorowicz Z et al. Histamine H2-receptor antagonists for urticaria.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419335>

Rekommendation (Grade 2A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Ranitidin oralt 15 mg/mL

(Zantac) oral lösning



LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4613

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-03-26

ePedID: 4613

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-10

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT