



Kargluminsyra oralt 200 mg

(Carbaglu) dispergerbar tablett

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletterna kan delas i halvor, ibland kan det också vara nödvändigt att använda fjärdedelar för att uppnå patientens dos. Tabletten har tre skåror för att underlätta delning.

Tabletterna ska inte sväljas hela utan lösas upp i lite vatten före administrering, ca 2,5 mL vatten för varje halv tablett. Den upplösta blandningen ska intas omedelbart och då tabletten inte löser sig helt ska bågaren sköljas ur.

Enteralt i sond

ÖVRIG INFORMATION

Behandling bör inledas under överinseende av läkare med erfarenhet av metabola sjukdomar.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Carbaglu (registrerad produkt)

200 mg, Dispergerbar tablett

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp fram till öppnande, därefter i skydd mot kyla, dock högst 30 °C. Öppnad burk hållbar 3 mån. Fuktkänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hyperammonemi (P-ammoniumjon över 200 mikromol/l och slöhet eller stånkig andning)

Nyfödda:

Laddningsdos: 100 - 250 mg/kg

Underhållsdos: 25 - 60 mg/kg x 4 alt. 75 - 100 mg/kg x 2 -3 (motsvarar 200 mg/kg/dygn.

Barn 1 mån - 18 år:

Laddningsdos: 100 - 250 mg/kg

Underhållsdos: 25 - 60 mg/kg x 4 alt. 75 - 100 mg/kg x 2 -3 (motsvarar 200 mg/kg/dygn.

Dosen justeras för att upprätthålla normala ammoniaknivåer. Vanlig dygnsdos varierar mellan 10 och 200 mg/kg.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4621

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-08-24

ePedID: 4621

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-09-04

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT