



Kargluminsyra oralt 200 mg

(ex Carbaglu) dispergerbar tablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Carbaglu dispergerbar tablett 200 mg
Kargluminsyra Waymade dispergerbar tablett 200 mg
Ucedane dispergerbar tablett 200 mg

ADMINISTRERINGSSÄTT

Tabletterna ska ges omedelbart före måltid eller matning.

Tabletterna kan delas i halvor för att ge en halv dos. Ibland kan det också vara nödvändigt att använda fjärdedelar för att uppnå patientens dos, använd i så fall Carbaglu eller Kargluminsyra Waymade som har tre skårer och kan delas i fjärdedelar.

Tabletterna ska inte sväljas hela utan lösas upp i lite vatten före administrering, ca 2,5 mL vatten för varje halv tablett. Den upplösta blandningen ska intas omedelbart och då tabletten inte löser sig helt måste bägaren sköljas ur för att få med hela dosen.

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Carbaglu (registrerad produkt)

200 mg, Dispergerbar tablett

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp fram till öppnande, därefter i skydd mot kyla, dock högst 30 °C. Öppnad burk hållbar 3 mån. Fuktkänsligt.

Kargluminsyra Waymade (registrerad produkt)

200 mg, Dispergerbar tablett

HÅLLBAR: Öppnad burk: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Öppnad burk hållbar 1 månad, förvaras i skydd mot kyla. Fuktkänsligt.

Ucedane (registrerad produkt)

200 mg, Dispergerbar tablett

HÅLLBAR: Inga särskilda förvaringsanvisningar

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling bör ske i samråd med läkare med erfarenhet av metabola sjukdomar.

Hyperammonemi (P-ammoniumjon över 200 mikromol/L och slöhet eller stånkig andning)

AKUT skede

Nyfödda:

Laddningsdos: 100 mg/kg, därefter 25 - 62,5 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år:

Laddningsdos: 100 mg/kg, därefter 25 - 62,5 mg/kg x 4

Fortsatt underhållsbehandling för att upprätthålla normala ammoniaknivåer

Vanlig dygnsdos är vanligen mellan 10 och 100 mg/kg.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Häberle et al. Suggested guidelines for the diagnosis and management of urea cycle disorders. 2012

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22642880>

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4621

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-01-11

ePedID: 4621

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2019-01-14

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-01-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT