



# Lorazepam oralt/sublinguallt 1 mg

(ex Temesta) tablett/munsönderfallande tablett/resoriblett

**Risk för andningsdepression och sedering. Förhöjd risk vid samtidig opioidbehandling. Även risk för paradoxala reaktioner.**

**Risk för tillvänjning.**

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett (ex Temesta)  
Munsönderfallande tablett (ex Temesta Expidet licens)  
Resoriblett (ex Lorazepam sublingual licens)

## ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering.  
Munsönderfallande tabletten kan lösas upp i vatten för omedelbar administrering

Sublinguallt: Resoribletten placeras under tungan och ska ligga kvar tills den lösts upp helt.  
Förtäring av mat eller dryck bör undvikas innan resoribletten har lösts upp fullständigt.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Lorazepam (registrerad produkt)

1 mg, Tablett

Förvaras i originalförpackningen vid högst 25 °C.

### Lorazepam. (licensprodukt)

1 mg, Munsönderfallande tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt.

1 mg, Resoriblett, sublingual

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Katatoni (off-label)

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

Behandling ska inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Barn 12 - 18 år: 1 - 2 mg x 2 - 6 (1 - 2 tabletter)

## ÖVRIG INFORMATION

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel bör generellt undvikas som sederande läkemedel. Det föreligger risk för tolerans och beroendeutveckling.

Antidot: flumazenil (f.d Lanexat). OBS - flumazenil är olämpligt att ge till patient med epilepsi/kramper då den plötsliga antagonistiska effekten i sig kan orsaka kramper.

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Ahmet Unal et al. The use of lorazepam and electroconvulsive therapy in the treatment of catatonia: treatment characteristics and outcomes in 60 patients.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28640169>

PubMed PMID Kendrick JG. Pharmacologic Management of Agitation and Aggression in a Pediatric Emergency Department - A Retrospective Cohort Study

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30697130>

PubMed PMID Sienaert P. et al. A clinical review of the treatment of catatonia

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25538636>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

## LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4643](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4643)





# Lorazepam oralt/sublinguallt 1 mg

(ex Temesta) tablett/munsönderfallande tablett/resoriblett

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4643

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-03-19

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**