



Metoprolol intravenös inj/inf 1 mg/mL

(ex Seloken)

INGEN SPÄDNING

INF/INJ
1 mg/mL
5 mL

ADMINISTRERING

Intravenös injektion/infusion: 5 - 10 min

RIMLIG DOS för Metoprolol intravenös inj/inf 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mg/kg	-	0,5 mL	1 mL	5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Metoprolol (registrerad produkt)

1 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej sparas, används direkt, gäller för samtliga fabrikat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med barnkardiolog och/eller intensivvårdsläkare

Supraventrikulär takykardi, tydligt påverkad patient (2:a handsval)

Barn 1 mån - 18 år: Initial testdos 0,02 mg/kg. Därefter 0,1 mg/kg

Dosen kan upprepas var 5:e minut, dock totalt i max 3 doser.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress <https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/426/metoprolol>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4645

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4645

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-01-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT