



Metoprolol intravenös inj/inf 1 mg/mL

(Seloken)

Ges i samråd med barnkardiolog och/eller intesivvårdsläkare

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion: 5 - 10 min

ÖVRIG INFORMATION

Intravenös behandling med metoprolol är andrahandsalternativ vid supraventrikulär takykardi

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Metoprolol (registrerad produkt)

1 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Får ej sparas, används direkt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Supraventrikulär takykardi, tydligt påverkad patient

Barn 1 mån - 18 år: Initial testdos 0,02 mg/kg. Därefter 0,1 mg/kg

Dosen kan upprepas var 5:e minut, max 3 doser.

RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mg/kg	-	0,5 mL	1 mL	5 mL

REFERENS/LÄNK

Rekommendation (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4645

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-06-28

ePedID: 4645

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-08-29

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-08-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT