



Natriumcitrat + Natriumlaurylsulfoacetat rektalt (Microlax)

Microlax har ofta sämre effekt än Resulax eller Klyx och ger oftare upphov till sveda i ändtarmen och rekommenderas därför inte.

ADMINISTRERING

Rektalt: Dra ut tuben fortfarande ihopklämd.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Microlax (registrerad produkt)

Rektallösning

Förvaras vid högst 25 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Tillfällig obstipation

Kombineras ofta med oralt laxantia.

Barn från 3 år: 1 klyksma

Ges som engångsdos.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Riktlinje för primärvården, Förstoppning hos barn

<https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/medicinska-omraden/barn-och-ungdom/ako/forstoppning-hos-barn/>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstoppning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk---oversikt/forstoppning/>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4646

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-09-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT