



Natriumcitrat + natriumlaurylsulfoacetat rektalt (Microlax)

Microlax har ofta sämre effekt än Resulax eller Klyx och ger oftare upphov till sveda i ändtarmen och rekommenderas därför inte.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Rektalt: Hos barn under 3 år förs tubspetsen in endast till ca halva sin längd, se markering.

Dra ut tuben fortfarande ihopklämd.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Microlax (registrerad produkt)

1 st, Rektallösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Tillfällig obstipation

Kombineras ofta med oralt laxantia.

Barn 1 mån - 1 år: 1/2 tub

Barn över 1 år: 1 tub

Ges som engångsdos.

Hos barn under 3 år förs tubspetsen in endast till ca halva sin längd, se markering.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Riktlinje för primärvården, Förstoppning hos barn

<https://vardgivare.skane.se/varldriktlinjer/medicinska-omraden/barn-och-ungdom/ako/forstoppning-hos-barn/>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstoppning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk/forstoppning/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-01-22

ePedID: 4646

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-01-22

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-01-22

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT