



## Midazolam intravenös inf/inj 0,5 mg/mL

(f.d Dormicum) nyfödda

**Försiktighet till prematurt nyfödda barn.**

**Dos styrs av patientens respons och övervakningsmöjlighet.**

### EN-STEGSSPÄDNING

Midazolam 1 mg/mL 5 mL	+	Glukos 50 mg/mL alt NaCl 9 mg/mL 5 mL	=	INJ-INF LÖ <b>0,5 mg/mL</b> 10 mL
------------------------------	---	---	---	---

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion: 0,5 - 3 min.

Intravenös infusion (kontinuerlig)

Anslagstid 1 - 3 min. Duration 45 - 60 min.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Rekommenderas vanligen inte till prematurt nyfödda barn under GA v 34 pga risk för paradoxal reaktion, hypotension och påverkad cerebral cirkulation.

#### Anfall hos nyfödda

Laddningsdos, bolus: 0,05 - 0,2 mg/kg = 50 - 200 MIKROG/kg

Underhållsdos: 0,05 - 0,4 mg/kg/tim = 50 - 400 MIKROG/kg/tim

#### Sedering

Nyfödda:

Laddningsdos, bolus: 0,05 - 0,1 mg/kg = 50 - 100 MIKROG/kg

Kontinuerlig infusion: 0,05 - 0,15 mg/kg/tim = 50 - 150 MIKROG/kg/tim - startdos, kan ökas vid behov.

### RIMLIG DOS FÖR 0,5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mg/kg	0,2 mL	1 mL	-	-
0,2 mg/kg	0,4 mL	2 mL	-	-
0,05 mg/kg/tim	0,1 mL/tim	0,5 mL/tim	-	-
0,4 mg/kg/tim	0,8 mL/tim	4 mL/tim	-	-



## Midazolam intravenös inf/inj 0,5 mg/mL

(f.d Dormicum) nyfödda

### ÖVRIG INFORMATION

Bolusinjektion midazolam har kort halveringstid och därför ordineras ofta efterföljande infusion för att förhindra ytterligare anfall, särskilt om flera bolusinjektioner behövs.

Respiratoriskt och cirkulatoriskt stabil patient som övervakas med kontinuerlig saturationsmätning kan vårdas på vanlig vårdavdelning med midazolam, infusionstakt upp till och med 0,2 mg/kg/tim. Om patient ej bedöms vara respiratoriskt och cirkulatoriskt stabil bör vården ske på intensivvårdsavdelning.

Enligt en Cochrane sammanställning rekommenderas inte midazolam infusion till prematura barn pga CNS biverkningar. Vissa neonataloger menar dock att det kan ges med försiktighet till prematura barn.

Midazolam metaboliseras av CYP3A4. Vid samtidig administrering av andra läkemedel som påverkar detta enzym kan midazolamdosen behöva justeras.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Midazolam (från registrerad produkt)

1 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvara ampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

0,5 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim kylskåp, 12 tim rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Barnläkarforeningen, Epilepsi, Handläggningstöd

<http://snpf.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

Internetadress ePed.se, Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Internetadress Svensk barnsmärtforening - Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden

<http://www.svenskbarnsmartforening.se/svenskbarnsmartforening/extern/nyfoddhetssmarta.htm>

NeoFax

PubMed PMID Effects of midazolam and morphine on cerebral oxygenation and hemodynamics in ventilated premature infants

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16717443>

PubMed PMID Intravenous midazolam infusion for sedation of infants in the neonatal intensive care unit.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28141899>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4647](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4647)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-05-30

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-06-04

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

ePedID: 4647

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2018-06-04

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**