



Oxikodon intravenös inf 1 mg/mL

(ex OxyNorm)

Noggrann övervakning av andning och eventuellt behov av respiratorunderstöd, framförallt vid högre doser.

EN-STEGSSPÄDNING

Oxikodon (ex OxyNorm) 10 mg/mL 5 mL	+	NaCl 9 mg/mL 45 mL	=	INF 1 mg/mL 50 mL
---	---	-----------------------	---	--------------------------------

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion (kontinuerlig)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Oxikodon (ex OxyNorm) (registrerad produkt)

10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur.

1 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim kylskåp, 12 tim rumstemperatur. Infusion kan pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

ÖVRIG INFORMATION

Administrering och dosering skall individualiseras, hänsyn bör tas till smärtans natur och svårighetsgrad samt patientens allmäntillstånd.

Vid övergång från intravenös till peroral administrering bör dygnsdosen höjas 1,3 - 2 gånger pga lägre biotillgänglighet. Biotillgängligheten är högre för oxikodon jämfört med morfin.

Vid utsättande efter 6 dygns opioidbehandling bör dosen successivt reduceras. Initial dosminskning med 20 - 40 %, därefter gradvis med 10 - 20% under ca 5 dygn.

Oxikodon är en opioid med effekt även på kappa receptorn. Kappa-receptorer finns perifert i bukorganen och oxikodon kan ha en fördel vid behandling av visceral smärta jämfört med övriga opioider.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Smärta

Bolus (inkl laddningsdos)

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 20 mikrog/kg. Max 4 - 5 gånger under 15 min.

Kontinuerligt

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 20 (- 50) mikrog/kg/tim

RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mikrog/kg/tim	10 mL/tim	50 mL/tim	100 mL/tim	500 mL/tim
40 mikrog/kg/tim	40 mL/tim	200 mL/tim	400 mL/tim	2000 mL/tim

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed.se, Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Internetadress Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

Internetadress SFBABI - Riktlinjer för smärtbehandling hos barn, Akut och postoperativ smärta

<https://sfai.se/delforeningar/sfbabi/riktlinjer/>

Internetadress SFBABI - Sederig vid intensivvård av barn

<https://sfai.se/>

Rekommendation (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-03-14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-03-14

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4651

Versionsnummer, major: 3

Giltig fr o m: 2018-03-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT