



Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL

(ex OxyNorm)

Noggrann övervakning av andning och eventuellt behov av respiratorunderstöd, framförallt vid högre doser.

EN-STEGSSPÄDNING

Oxikodon (ex OxyNorm) 10 mg/mL 5 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 45 mL	=	INJ-INF LÖ 1 mg/mL 50 mL
---	---	--	---	---------------------------------------

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion (kontinuerlig)

Intravenös injektion

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Smärta

Bolus (inkl laddningsdos)

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 20 mikrog/kg. Max 4 - 5 gånger under 15 min.

Kontinuerligt

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 20 (- 50) mikrog/kg/tim

Intermittent

Barn 1 mån - 18 år: 25 - 200 mikrog/kg

Dos kan upprepas efter utvärdering av smärtsituation.

RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
25 mikrog/kg	-	0,12 mL	0,25 mL	-
100 mikrog/kg	-	-	1 mL	5 mL
10 mikrog/kg/tim	-	-	0,1 mL/tim	0,5 mL/tim
40 mikrog/kg/tim	-	0,2 mL/tim	0,4 mL/tim	2 mL/tim

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

Internetadress SFBABI - Riktlinjer för smärtbehandling hos barn, Akut och postoperativ smärta

<https://sfai.se/delforeningar/sfbabi/riktlinjer/>

Internetadress SFBABI - Seding vid intensivvård av barn

<https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/intensivvard/seding-vid-intensivvard-av-barn/>

Internetadress VGR, Alfresco - Oxycodone (OxyNorm) spädningskort BIVA

[https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/16089/Oxycodone%20\(Oxynorm\)%20-%20sp%C3%A4dningskort%20p%C3%A5%20BIVA.pdf?a=false&guest=true](https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/16089/Oxycodone%20(Oxynorm)%20-%20sp%C3%A4dningskort%20p%C3%A5%20BIVA.pdf?a=false&guest=true)

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL

(ex OxyNorm)

ÖVRIG INFORMATION

Administrering och dosering skall individualiseras, hänsyn bör tas till smärtans natur och svårighetsgrad samt patientens allmäntillstånd.

Vid övergång från intravenös till peroral administrering bör dygnsdosen höjas 1,3 - 2 gånger pga lägre biotillgänglighet. Biotillgängligheten är högre för oxikodon jämfört med morfin.

Vid utsättande efter 6 dygns opioidbehandling bör dosen successivt reduceras. Initial dosminskning med 20 - 40 %, därefter gradvis med 10 - 20 % under ca 5 dygn.

Oxikodon är en opioid med effekt även på kappa-receptorn. Kappa-receptorer finns perifert i bukorganen och oxikodon kan ha en fördel vid behandling av visceral smärta jämfört med övriga opioider.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Oxikodon (ex OxyNorm) (registrerad produkt)

10 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur.

1 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim kylskåp, 12 tim rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller

utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-08-21

ePedID: 4651

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-08-29

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-08-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT