



Pankuroniumbromid intravenös inj 0,2 mg/mL

(ex Pancuronium Actavis licens)

Muskelrelaxerande medel, slår ut patientens andning. Patienten ska därför vara sövd när detta läkemedel ges.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av pankuroniumbromid 2 mg/mL (ex Pancuronium Actavis och Pancuronium Bromide 2 mg/mL).

EN-STEGSSPÄDNING

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|
| Pankuroniumbromid 2 mg/mL 1 mL | + | NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 9 mL | = | INJ 0,2 mg/mL 10 mL |
|--------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: Andra läkemedel bör inte ges i samma infart som pankuronium.

RIMLIG DOS för Pankuroniumbromid intravenös inj 0,2 mg/mL

| | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 50 kg |
|------------|--------|---------|--------|---------|
| 0,02 mg/kg | 0,1 mL | 0,5 mL | - | - |
| 0,1 mg/kg | 0,5 mL | 2,5 mL | 5 mL | 25 mL |
| 0,15 mg/kg | - | 3,75 mL | 7,5 mL | 37,5 mL |

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Pankuroniumbromid (licensprodukt)

2 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp, får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.

0,2 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

HÅLLBAR: Används direkt efter iordningställandet.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Muskelrelaxantia

Ordineras av anestesilog.

Nyfödda: Initialt 0,1 (- 0,2) mg/kg. Om dosen behöver upprepas ges 0,05 mg/kg tidigast 1 - 2 tim efter föregående dos.

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 0,1 (- 0,15) mg/kg. Om dosen behöver upprepas ges 0,02 - 0,15 (- 0,2) mg/kg tidigast 1 - 2 tim efter föregående dos.

Effekt av pankuronium uppträder vanligtvis inom 2 - 3 min.

ÖVRIG INFORMATION

Innan behandlingsstart ska elektrolytrubbningar, förhöjt pH samt dehydrering justeras. Användning av kolinesterashämmare, t ex. neostigmin häver effekten av pankuronium. Pankuronium interagerar med ett flertal läkemedel, t ex aminoglykosider. Pankuronium kan bidra till ökad hjärtfrekvens hos barn, effekten är oftast dosberoende.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Neonatal Formulary

Pediatric Dosage Handbook

Pediatric Injectable Drugs

Produktinformation Pancuronium Bromide

<https://www.medicines.org.uk/emc/product/3793/smpc>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4654





Pankuroniumbromid intravenös inj 0,2 mg/mL

(ex Pancuronium Actavis licens)

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-02-13

ePedID: 4654

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-02-19

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-02-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT