



Pankuroniumbromid intravenös inj 0,2 mg/mL

(ex Pancuronium Actavis licens)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av pankuroniumbromid 2 mg/mL (ex Pancuronium Actavis och Pancuronium Bromide 2 mg/mL).

EN-STEGSSPÄDNING

Pankuroniumbromid 2 mg/mL 1 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 9 mL	=	INJ 0,2 mg/mL 10 mL
--------------------------------------	---	---	---	----------------------------------

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion: Andra läkemedel bör inte ges i samma infart som pankuronium.

RIMLIG DOS för Pankuroniumbromid intravenös inj 0,2 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,02 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	-	-
0,1 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	25 mL
0,15 mg/kg	-	3,75 mL	7,5 mL	37,5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Pankuroniumbromid (licensprodukt)

2 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp, får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.

0,2 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

HÅLLBAR: Används direkt efter iordningställandet.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Muskelrelaxantia

Ordineras av anestesilog.

Nyfödda: Initialt 0,1 (- 0,2) mg/kg. Om dosen behöver upprepas ges 0,05 mg/kg tidigast 1 - 2 tim efter föregående dos.

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 0,1 (- 0,15) mg/kg. Om dosen behöver upprepas ges 0,02 - 0,15 (- 0,2) mg/kg tidigast 1 - 2 tim efter föregående dos.

Effekt av pankuronium uppträder vanligtvis inom 2 - 3 min.

ÖVRIG INFORMATION

Innan behandlingsstart ska eventuellt elektrolytrubbningar, förhöjt pH samt dehydrering justeras.

Användning av kolinesterashämmare, t ex. neostigmin häver effekten av pankuronium.

Pankuronium interagerar med ett flertal läkemedel, t ex aminoglykosider.

Pankuronium kan bidra till ökad hjärtfrekvens hos barn, effekten är oftast dosberoende.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Neonatal Formulary

Pediatric Dosage Handbook

Pediatric Injectable Drugs

Produktinformation Pancuronium Bromide

<https://www.medicines.org.uk/emc/product/3793/smpc>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4654



Pankuroniumbromid intravenös inj 0,2 mg/mL

(ex Pancuronium Actavis licens)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-02-11

ePedID: 4654

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-02-12

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-02-12

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT