



Taurolock instillation

(Taurolock U 25000) med urokinas 5 000 E/mL

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Taurolock med urokinas 25 000 E (medicinteknisk produkt). Kombinationsförpackning bestående av frystorkat pulver urokinas 25 000 E samt ampull med 5 mL Taurolock.

EN-STEGSSPÄDNING

Urokinas		Taurolock		INSTILL
25000 E	+		=	5000 E/mL
1 st		5 mL		5 mL

Beredningsinstruktion:

Lösningen iordningställs genom att den medföljande vätskan, 5 mL Taurolock, tillförs flaskan med urokinaspulver.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös instillation:

Innan instillation ska accesssystemet spolas med NaCl 9 mg/mL. Mängd: 1 - 2 mL/kg, max 40 mL.

Instillera därefter Taurolock med urokinas långsamt i subkutan venport (SVP), central dialyskateter (CDK) alt. central venkateter (CVK):

- barn under 2 år inte snabbare än 1 mL/5 sek
- barn från 2 år inte snabbare än 1 mL/sek

Innan påkoppling av ny parenteral nutrition bör Taurolock med urokinas aspireras och kasseras.

Innan nästa behandlingsstart spola med 10 mL NaCl 9 mg/mL. Om aspirering inte är möjlig får lösningen spolas in långsamt, max 1 mL/3 sek. Om så görs ska den potentiella systemiska effekten av urokinas beaktas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Trombolys eller misstanke om koagelbildning, i central venkateter (CVK), central dialyskateter (CDK) eller subkutan venport (SVP)

Instillera Taurolock med urokinas med en volym som fyller kateterskänkel/skänklar efter avslutad infusion.

Volymen beräknas individuellt utifrån antal kranar, kopplingar, förlängningskatetrar och CVK-typ (antal skänklar, storlek etc).

Låt lösningen ligga kvar till nästa användning, dock maximalt 30 dagar.

ÖVRIG INFORMATION

Misstanke om koagelbildning är t. ex. när det är trögt att spola in eller svårt att aspirera blod.

Taurolock innehåller taurolidin och citrat (4 %).

REFERENS/LÄNK

Internetadress Produktinformation Taurolock, svensk hemsida

<http://transcutan.com/sv/taurolock-sv/>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-03-03

ePedID: 4665

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-03-18

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-03-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Taurolock instillation

(Taurolock U 25000) med urokinas 5 000 E/mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Taurolock med urokinas (medicinteknisk produkt)

25000 E, Pulver till instillationsvätska

HÅLLBAR: Kombinationsförpackning med frystorkat pulver urokinas och Taurolock förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas.

5000 E/mL, Instillationsvätska

HÅLLBAR: Färdigblandad lösning ska användas direkt.