



## Taurolock instillation

(Taurolock U 25000) med urokinas 5 000 E/mL

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Taurolock med urokinas 25 000 E (medicinteknisk produkt). Kombinationsförpackning bestående av frystorkat pulver urokinas 25 000 E samt ampull med 5 mL Taurolock.

### EN-STEGSSPÄDNING

Urokinas		Taurolock		INSTILL
25000 E				<b>5000 E/mL</b>
1 st	+	5 mL	=	5 mL

#### Beredningsinstruktion:

Lösningen iordningställs genom att den medföljande vätskan, 5 mL Taurolock, tillförs flaskan med urokinaspulver.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös instillation: Innan instillation ska accesssystemet spolas med 10 mL NaCl 9 mg/mL.

Instillera därefter Taurolock med urokinas långsamt i subkutan venport (SVP), central dialyskateter (CDK) alt. central venkateter (CVK):

- barn under 2 år inte snabbare än 1 mL/5 sek
- barn från 2 år inte snabbare än 1 mL/sek

Innan påkoppling av ny parenteral nutrition bör Taurolock med urokinas aspireras och kasseras.

Innan nästa behandlingsstart spola med 10 mL NaCl 9 mg/mL. Om aspirering inte är möjlig får lösningen spolas in långsamt, max 1 mL/3 sek. Om så görs ska den potentiella systemiska effekten av urokinas beaktas.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Taurolock med urokinas (medicinteknisk produkt)

25000 E, Pulver till instillationsvätska

HÅLLBAR: Kombinationsförpackning med frystorkat pulver urokinas och Taurolock förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas.

5000 E/mL, Instillationsvätska

HÅLLBAR: Färdigblandad lösning ska användas direkt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Trombolys eller misstanke om koagelbildning, i central venkateter (CVK), central dialyskateter (CDK) eller subkutan venport (SVP)

Instillera Taurolock med urokinas med en volym som fyller kateterskänkel/skänklar efter avslutad infusion.

Volymen beräknas individuellt utifrån antal kranar, kopplingar, förlängningskatetrar och CVK-typ (antal skänklar, storlek etc).

Låt lösningen ligga kvar till nästa användning, dock maximalt 30 dagar.

### ÖVRIG INFORMATION

Misstanke om koagelbildning är t. ex. när det är trögt att spola in eller svårt att aspirera blod.

Taurolock innehåller taurolidin och citrat (4 %).

### REFERENS/LÄNK

Internetadress Produktinformation Taurolock

<http://transcutan.com/sv/taurolock-sv/>

Internetadress Produktinformation Taurolock, tysk hemsida

<http://www.taurolock.com>

Rekommendation , (Grade 2D)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-09-28

ePedID: 4665

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-10-20

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-10-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT