



Tranexamsyra intravenös inf/inj 20 mg/mL

(ex Cyklokapron)

EN-STEGSSPÄDNING

Tranexamsyra		NaCl 9 mg/mL		INJ/INF
100 mg/mL	+		=	20 mg/mL
10 mL		40 mL		50 mL

ADMINISTRERING

Intravenös injektion: Laddningsdos ges vanligen under 10 min.

Intravenös infusion (kontinuerlig)

RIMLIG DOS för Tranexamsyra intravenös inf/inj 20 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mg/kg/tim	-	0,5 mL/tim	1 mL/tim	5 mL/tim
5 mg/kg/tim	-	1,25 mL/tim	2,5 mL/tim	12,5 mL/tim

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Tranexamsyra (registrerad produkt)

100 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras vid högst 25 °C, får ej frysas. Får ej sparas, används direkt.

20 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Försiktighet vid hematuri, trombos och disseminerad intravasal koagulation (DIC). Justera dosen vid njurpåverkan.

Vid behov rekommenderas kontakt med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour.

Mot blödning, perioperativt profylax

Barn under 15 kg (begränsad evidens):

Laddningsdos: 50 mg/kg

Underhållsdos: 5 mg/kg/tim

Barn över 15 kg (begränsad evidens):

Laddningsdos: 30 mg/kg

Underhållsdos: 2 mg/kg/tim

Hjärtstopp vid trauma

Tranexamsyra bör ges inom 3 tim till barn som har behov av blodtransfusion i samband med trauma.

Barn:

Laddningsdos: 15 - 20 mg/kg, max 1 gram

Underhållsdos: 2 mg/kg/tim, max 1 gram i 8 tim eller tills blödning upphör.

ÖVRIG INFORMATION

Kontraindicerat vid subaraknoidalblödning samt trombos.

Läkemedel som kan förlänga blödningstid t.ex. acetylsalicylsyra och NSAID ska inte användas vid blödarsjuka, risk för ökad blödningsbenägenhet.





Tranexamsyra intravenös inf/inj 20 mg/mL

(ex Cyklokapron)

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Internetadress HLR-rådet - Avancerad hjärt-lungräddning Barn, Handlingsplan

<https://hlrwebbutik.se/produkt-kategori/barn-a-hlr/>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH), Hemostas vid allvarlig blödning

<http://www.ssth.se/lankar>

Pediatric Dosage Handbook

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4667

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4667

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-03-31

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT