



Kaptopril oralt

(ex Extempore) tabletter/kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 25 och 50 mg
Kapsel med valfri styrka (extempore)

Till mindre barn, barn med sväljsvårigheter och administrering i sond rekommenderas kaptopril oral lösning, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Till mindre barn, barn med sväljsvårigheter och administrering i sond rekommenderas kaptopril oral lösning. I undantagsfall kan kapslarna öppnas och innehållet slammas upp i 2 - 3 mL vatten, detta ska ske i direkt anslutning till administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Kaptopril (registrerad produkt)

25 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkan 50 mg.

Kaptopril Extempore (extempore - ej lagervara)

1 st, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypertoni

Begränsad evidens för användning till nyfödda.

Nyfödda (prematura): Startdos 0,01 - 0,05 mg/kg
Om dosen tolereras kan samma dos ges x 2 - 3, max 0,3 mg/kg/dygn
Nyfödda (fullgångna): Startdos 0,05 mg/kg
Om dosen tolereras kan dosen dubbleras och därefter fortsatt upptrappning, måldos 0,5 - 1 mg/kg x 2 - 3, max 2 mg/kg/dygn

Barn 1 - 11 mån: Startdos 0,05 mg/kg x 3 - 4
Dosen ska trappas upp långsamt. Vanlig dos 0,1 - 0,3 mg/kg x 3 - 4, max 6 mg/kg/dygn
Barn 1 - 18 år: Startdos 0,1 - 0,2 mg/kg x 3
Dosen ska trappas upp långsamt. Vanlig dos 0,1 - 0,3 mg/kg x 3, max 6 mg/kg/dygn

Blodtrycket bör kontrolleras innan och efter administrerad dos vid insättning/dosökning. För nyfödda barn bör blodtrycket kontrolleras både 1 och 2 timmar efter administrerad dos.

Hjärtsvikt - "Afterload reduction"

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 0,1 mg/kg
Dosen ska trappas upp långsamt. Måldos 0,5 - 1 mg/kg x 3, max 6 mg/kg/dygn

Blodtryck och puls tas 1 timme före och efter 2 timmar vid insättning/dosökning.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Pediatric Dosage Handbook

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>



Kaptopril oralt

(ex Extempore) tabletter/kapslar



LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4677

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-11-28

ePedID: 4677

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-12-03

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-12-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT