



Vasopressin intravenös inf 0,1 E/mL

(ex Argipressin licens)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av licensprodukt vasopressin 20 E/mL

EN-STEGSSPÄDNING

Vasopressin 20 E/mL 0,25 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 49,75 mL	=	INF 0,1 E/mL 50 mL
-----------------------------------	---	---	---	---------------------------------

EN-STEGSSPÄDNING

Vasopressin 20 E/mL 0,5 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 99,5 mL	=	INF 0,1 E/mL 100 mL
----------------------------------	---	--	---	----------------------------------

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion (kontinuerlig): Bör administreras i central infart.

RIMLIG DOS FÖR 0,1 E/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,125 mE/kg/min	-	0,38 mL/tim	0,75 mL/tim	3,75 mL/tim
0,5 mE/kg/min	-	1,5 mL/tim	3 mL/tim	15 mL/tim

0,125 mE/kg/min = 7,5 mE/kg/tim motsvarar 0,075 mL/kg/tim

0,5 mE/kg/min = 30 mE/kg/tim motsvarar 0,3 mL/kg/tim

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandlingsrefraktär hypotension

Barn 1 mån - 18 år: 0,125 - 1 mE/kg/min

Kan ge grav metabol acidosis. Bör endast användas när höga doser noradrenalin inte har haft effekt.

ÖVRIG INFORMATION

Vasopressin = antidiuretiskt hormon (ADH)

Flerdosampuller med vasopressin innehåller konserveringsmedlet klorbutanol som har sedativ och lokalanestetisk effekt liknande kloralhydrat.

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4679

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-02-19

ePedID: 4679

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-02-20

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-02-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Vasopressin intravenös inf 0,1 E/mL

(ex Argipressin licens)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Vasopressin (licensprodukt)

20 E/mL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Får ej frysas. Brytampull sparas ej efter första uttag. I övrigt hänvisas till produktspecifik information då förvaringsbetingelser och hållbarhet skiljer sig åt mellan de olika preparaten.

0,1 E/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.