



Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL

(f.d Lanexat)

Kontinuerlig övervakning av patienten krävs.

Olämpligt att ge vid:

- **Aspiration eller annan pulmonell komplikation som i sig kräver intubation/respiratorbehandling.**
- **Känd epilepsi eller långvarigt bensodiazepinmissbruk.**
- **Blandintoxikation eller oklar förgiftning där EKG visar breddökade QRS-komplex och/eller kramprisk föreligger.**

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av injektionslösning 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 1

Flumazenil 0,1 mg/mL 0,9 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 9 mL	=	INF 9 mikrog/mL 9,9 mL
-----------------------------------	---	---	---	-------------------------------------

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Flumazenil 0,1 mg/mL 4 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 40 mL	=	INF 9 mikrog/mL 44 mL
---------------------------------	---	--	---	------------------------------------

ADMINISTRERING

Kontinuerlig infusion

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Överdoser/andningsdepression av bensodiazepiner

Se Övrig information för råd om undersökning innan administrering.
Vid tveksamheter ring Giftinformationscentralen, tel: 010-456 67 19.

Flumazenil som kontinuerlig infusion är ett alternativ till upprepade bolusdoser (se annan instruktion), t.ex. vid otillräcklig effekt eller om dåsigheten återkommer efter injektion.

Nyfödda: 2 - 10 mikrog/kg/tim

Barn 1 mån - 18 år: 2 - 10 mikrog/kg/tim, max 400 mikrog/tim

ÖVRIG INFORMATION

Före administrering: Diagnostiskt EKG. Vid kroppsundersökning måste ett status typiskt för bensodiazepin-inducerad medvetslöshet föreligga (generellt nedsatt muskeltonus, normala pupiller, frånvaro av fokalitet och hypertermi).

Flumazenil har generellt en kortare effektduration än bensodiazepiner. Kontinuerlig övervakning krävs tills risken för andningsdepression inte längre föreligger, minst 3 - 4 timmar efter sista givna dos flumazenil.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Internetadress Giftinformationscentralen- Bensodiazepiner.

<https://giftinformation.se/lakare/substanser/bensodiazepiner/>

Rekommendation (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade





Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL

(f.d Lanexat)

RIMLIG DOS för Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mikrog/kg/tim	0,22 mL/tim	1,11 mL/tim	2,22 mL/tim	11,11 mL/tim
10 mikrog/kg/tim	1,11 mL/tim	5,56 mL/tim	11,11 mL/tim	-
max 400 mikrog/tim	-	-	-	44,44 mL/tim

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Flumazenil (registrerad produkt)

0,1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C . Sparas inte efter första uttag. Om kvarstående mängd dras upp i spruta, kan sprutan förvaras 24 tim i kylskåp el 12 tim i rumstemp om bedömning el utvärdering utförts enl Svensk läkemedelsstandard, se ref Hållbarhetsinformation.

9 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp. Sparas inte om ursprungslösningen har sparats uppdragen i spruta.

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll 2021-06-03

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-07-06

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4681

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2021-07-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT