



Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL

(ex Lanexat)

Kontinuerlig övervakning av patienten krävs.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av injektionslösning flumazenil 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL till infusionslösning 9 mikrog/mL

EN-STEGSSPÄDNING

Flumazenil 0,1 mg/mL 0,9 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 9 mL	=	INF 9 mikrog/mL 9,9 mL
-----------------------------------	---	---	---	-------------------------------------

EN-STEGSSPÄDNING

Flumazenil 0,1 mg/mL 4 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 40 mL	=	INF 9 mikrog/mL 44 mL
---------------------------------	---	--	---	------------------------------------

ADMINISTRERINGSSÄTT

Kontinuerlig infusion

ÖVRIG INFORMATION

Flumazenil har generellt en kortare effekt än bensodiazepiner. Upprepade doser kan därför behövas. Kontinuerlig övervakning krävs tills risken för andningsdepression ej längre föreligger.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Flumazenil (registrerad produkt)

0,1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C . Sparas inte efter första uttag.

9 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 12 tim i rumstemp

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Överdoser/andningsdepression av bensodiazepiner

Som alternativ till upprepade bolusdoser (se annan instruktion), t.ex. vid otillräcklig effekt eller om dåsigheten återkommer efter injektion, kan flumazenil ges som kontinuerlig infusion.

Nyfödda: 2 - 10 mikrog/kg/tim

Barn 1 mån - 18 år: 2 - 10 mikrog/kg/tim, max 400 mikrog/tim

Maximal kumulativ dos:

Barn upp till 20 kg: 50 mikrog/kg

Barn över 20 kg: 1000 mikrog (1 mg)

RIMLIG DOS FÖR 9 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mikrog/kg/tim	0,22 mL/tim	1,11 mL/tim	2,22 mL/tim	11,11 mL/tim
10 mikrog/kg/tim	1,11 mL/tim	5,56 mL/tim	11,11 mL/tim	55,56 mL/tim

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-08-22

ePedID: 4681

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-09-03

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT