



# Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL

(f.d Lanexat)

**Kontinuerlig övervakning av patienten krävs.**

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av injektionslösning 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 1

Flumazenil 0,1 mg/mL 0,9 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 9 mL	=	INF <b>9 mikrog/mL</b> 9,9 mL
-----------------------------------	---	---	---	-------------------------------------

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 2

Flumazenil 0,1 mg/mL 4 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 40 mL	=	INF <b>9 mikrog/mL</b> 44 mL
---------------------------------	---	--	---	------------------------------------

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Kontinuerlig infusion

### RIMLIG DOS för Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mikrog/kg/tim	0,22 mL/tim	1,11 mL/tim	2,22 mL/tim	11,11 mL/tim
10 mikrog/kg/tim	1,11 mL/tim	5,56 mL/tim	11,11 mL/tim	-
max 400 mikrog/tim	-	-	-	44,44 mL/tim

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Överdoser/andningsdepression av bensodiazepiner

Som alternativ till upprepade bolusdoser (se annan instruktion), t.ex. vid otillräcklig effekt eller om dåsigheten återkommer efter injektion, kan flumazenil ges som kontinuerlig infusion.

Nyfödda: 2 - 10 mikrog/kg/tim

Barn 1 mån - 18 år: 2 - 10 mikrog/kg/tim, max 400 mikrog/tim

Maximal kumulativ dos:

Barn upp till 20 kg: 50 mikrog/kg

Barn över 20 kg: 1000 mikrog (1 mg)

## ÖVRIG INFORMATION

Flumazenil har generellt en kortare effekt än bensodiazepiner. Upprepade doser kan därför behövas. Kontinuerlig övervakning krävs tills risken för andningsdepression ej längre föreligger.

## REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Rekommendation (Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-04-08

ePedID: 4681

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-04-13

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2021-04-13

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**





## Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL

(f.d Lanexat)

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Flumazenil (registrerad produkt)

0,1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C . Sparas inte efter första uttag. Om kvarstående mängd dras upp i spruta, kan sprutan förvaras 24 tim i kylskåp el 12 tim i rumstemp om bedömning el utvärdering utförts enl Svensk läkemedelsstandard, se ref Hållbarhetsinformation.

9 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 12 tim i rumstemperatur, 24 tim i kylskåp. Sparas inte om ursprungslösningen har sparats uppdragen i spruta.