



Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL

ersättning av vätskeförlust enl. 1 %-regeln

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Schablonmässig ersättning av vätskeförluster från ventrikel eller stomi som överstiger 1 % av kroppsvikten per dygn med Natriumklorid 9 mg/mL.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ersättning av vätskeförluster från ventrikel eller stomi enligt 1 %-regeln

1 % av kroppsvikten = 10 mL/kg

Barn 1 mån - 18 år:

Vid vätskeförluster överstigande 1 % av kroppsvikten per dygn ska den vätskemängd som ÖVERSTIGER 1 % ersättas.

Om vätskebalansen räknas 2 gånger per dygn ska ersättningsvolymerna räknas och ersättas per 12 timmar.

Exempel:

Patientvikt: 3 kg

Vätskebalans: räknas 2 gånger per dygn

Förlust via v-sond mellan kl. 05.00 - 17.00, dvs per 12 timmar = 45 mL

1 % av kroppsvikten = 30 mL, denna volym får förloras per dygn utan ersättning.

Eftersom vätskebalansen räknas 2 gånger per dygn får barnet förlora 15 mL/12 timmar.

Volym att ersätta = beräknad förlust/12 timmar - volym som får förloras/12 timmar
= 45 mL - 15 mL = 30 mL

Dessa 30 mL ska ges under nästkommande 12-timmarsperiod.

REFERENS/LÄNK

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4685

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-03-28

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-03-28

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4685

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2018-03-28

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT