



Nusinersen intratekalt 12 mg

(Spinraza)

Innan dosen administreras ska motsvarande volym (5 mL) cerebrospinalvätska avlägsnas.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd injektionslösning nusinersen 12 mg/5 mL.

Låt lösningen anta rumstemperatur, yttre värmekälla ska inte användas. Lösningen ska vara klar och färglös. Lösningen får inte spädas.

ADMINISTRERINGSSÄTT

IntraTEKAL injektion:
Ges under 1 - 3 minuter genom lumbalpunktion med en kanyl för spinalanestesi.
Efter administreringen bör patienten ligga ner i 1 timme.

ÖVRIG INFORMATION

Hantering av glömd eller fördröjd dos:

Laddningsdos: administreras så snart som möjligt, sedan följs ordinerad doseringsfrekvens men det ska vara minst 14 dagar mellan doserna.

Underhållsdos: administreras så snart som möjligt, sedan fortsatt dosering var 4:e månad.

Nusinersen är mycket dyrt, en dos kostar ca 800 000 kr (april 2018).

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Nusinersen (registrerad produkt)

12 mg, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterkartong, ljuskänsligt. Öppnad flaska kan förvaras i rumstemp i 14 dagar om skyddad för ljus i originalfrp, annars högst 30 timmar. När lösningen dragits upp i spruta ska den användas inom 6 timmar, annars kasseras.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Spinal muskelatrofi typ 5q

Nyfödda:

Laddningsdos: 12 mg (5 mL) ges dag 0, dag 14, dag 28 och dag 63

Underhållsdos: 12 mg (5 mL) var 4:e månad

Barn 1 mån - 18 år:

Laddningsdos: 12 mg (5 mL) ges dag 0, dag 14, dag 28 och dag 63

Underhållsdos: 12 mg (5 mL) var 4:e månad

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

NeoFax

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-04-05

ePedID: 4689

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-10

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT