



Acitretin oralt 2 mg/mL

(Extempore från Neotigason)

Ska ej hanteras av gravida eller de som försöker bli gravida
Bör hanteras med försiktighet av kvinnor i fertil ålder

Ska EJ spädas på avdelning på grund av teratogenicitet, måste beställas extempore

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

ÖVRIG INFORMATION

Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Kontraindicerat tillsammans med andra retinoider samt tetracykliner och metotrexat.

Det finns en risk för att lever, skelett och blodfetter påverkas vid långtidsbehandling

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Neotigason (registrerad produkt)

2 mg/mL, Oral vätska

HÅLLBAR: Extempore hållbar 7 dagar i kylskåp, från tillverkningsdatum.

Ljuskänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Svåra kongenitala iktyoser (Harlekiniktyos)

Ordineras i samråd med hudläkare.

Nyfödda: 0,5 (- 1) mg/kg x 1

RIMLIG DOS FÖR 2 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	0,25 mL	1,25 mL	-	-

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Socialstyrelsen, Ovanliga diagnoser, Kongenital iktyos

<http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/kongenitaliktyos>

PubMed PMID Glick JB, et al. Improved Management of Harlequin Ichthyosis With Advances in Neonatal Intensive Care, Pediatrics, 2017, 139(1)

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27999114>

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Lisa Morota 2018-04-16

ePedID: 4694

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-23

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-23

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT