



Makrogol oralt

(Forlax Junior)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Pulver till oral lösning i dospåse Forlax Junior.

Beredningsinstruktion:

Innehållet i en dospåse ska lösas i ca 50 mL vatten precis innan intag.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

ÖVRIG INFORMATION

Behandling av barn bör inte överstiga 3 månader.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Obstipation

Barn 6 mån - 1 år: 1 dospåse per dag

Barn 1 - 4 år: 1 - 2 dospåsar per dag

Barn 4 - 8 år: 2 - 4 dospåsar per dag

Vid dosering av mer än 1 dospåse per dag ska dosen delas upp på två dostillfällen (morgon och kväll).

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-04-18

ePedID: 4696

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-20

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT